

## “政德” 愛仕達 錠 2 公絲 ( 氫偶素 ) (Estradiol)

## Estra Tablets 2mg

Estra 是一種有效的女性荷爾蒙製劑，可維持女性生殖系統正常功能及女性第二性徵。主成分 Estradiol Valerate 為人體內主要的動情激素，能補充體內女性荷爾蒙分泌不足，改善荷爾蒙分泌不平衡的狀況，模擬內生性荷爾蒙在體內的生化反應，使卵巢維持正常生理功能。

本品使用於女性因性腺功能減退、卵巢切除或初發性卵巢衰竭引起之動情激素缺乏，月經閉止，初發性月經困難及停經引起的更年期諸症狀如熱潮紅、出汗、女陰或陰道萎縮等，並可預防體質疏鬆，減少骨質流失。

**成 分：**每錠含：

主成分：

Estradiol Valerate.....2mg

賦形劑: Lactose、Starch、Calcium phosphate、New coccine、Magnesium Stearate、Talc、Silicon dioxide

**適應症：**更年期症狀及停經後引起的各種病症、卵巢切除之患者（因疾病或腫瘤而將卵巢切除）。**用法用量：**

一般開始使用時，一天一次每次 2mg，連用 20 天或 21 天休息停用 1 週，輕微症狀或症狀減輕後改用一天一次每次 1mg，在視病情及治療之需要與否再停用。本藥須由醫師處方使用。

**注意事項：**

1. 禁止：懷孕婦女、不明原因的陰道出血、患有乳癌、子宮內膜腫瘤、黃疸、循環系統疾病如血栓性靜脈炎、血栓性栓塞疾病、血栓症者，禁止服用本藥。
2. 患有氣喘、心臟機能不全、癲癇、精神性抑鬱、腎功能不全、腦血管疾病、冠狀動脈疾病、糖尿病、膽囊疾病、肝功能障礙、尿道纖維肌瘤者應小心使用。
3. 副作用：食慾減低、下腹疼痛、噁心、嘔吐、水腫。
4. 本品配合 Medroxyprogesterone Acetate 5mg 於第 12 天至第 21 天使用，可避免子宮內膜受到過度刺激，更接近正常卵巢生理週期之狀況，減少罹患子宮內膜腫瘤的危險性。
5. 停藥時會有出血現象。若有不正常出血，如：大量出血、點狀出血、點狀出血，長期出血或服藥期間出血，應即停止服藥。

**包 裝：**6~1000 錠瓶裝及 6~1000 錠鋁箔盒裝。**政德製藥股份有限公司**

雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路 2 號