

"安星" 安克痛 注射液 Ankoton Injection "Astar"

(成份)

Each ml contains:

Sodium Chondroitin Sulfate.....	10mg
Sodium Salicylate.....	20mg
及Disodium Edetate、Water For Injection。	

(作用)

1. Sodium Chondroitin Sulfate 是一種Mucopolysaccharides，為軟骨組織，膠原纖維，彈力纖維及細胞間基質的主要成分，對於防止老化、動脈硬化、風濕症及多樣性關節炎等膠原病有效，還具有淨化血清脂質，增進解毒機能及保肝等作用。
2. Sodium Salicylate 兼具解熱、鎮痛及抗炎症作用，作用於視丘下部的溫熱中樞，增加末梢血流及發汗，而促進熱的發散，使體溫下降，緩和末梢及中樞神經系之疼痛，且對各種炎症及關節炎樣症候群有抑制作用。
3. 本品綜合上述二者的藥效，發揮其相乘效果，是對比林系藥物過敏者之安全、有效的更替治療藥物。

(適應症)

解熱、鎮痛(神經痛、腰痛、關節痛、肩痛、肌肉痛)。

(用法、用量)

1. 通常成人一次20ml，一日一次，靜脈內徐緩注射。
2. 本藥限由醫師使用。

(注意事項)

1. 一般的注意：

- a. 水楊酸系製劑和雷氏症候群的因素關係未明，曾疑有關連性的免疫學調查報告，未滿15歲的水痘、流行性感冒、不得不投予的患者，要慎種投予，投與後須十分注意觀察患者的狀態。
- b. 因會引起休克，在不可能經口投予，且必須緊急鎮痛的場合，才考慮投予，又使用本劑時，希望能隨時準備急救處置。
- c. 為預測休克的反應，要詳細問診。
- d. 伴有高熱的小兒、幼兒及高齡者，或消耗性疾患的患者，出現劇烈的作用，如過度的體溫下降、虛脫、四肢冷卻的現象。故此類患者在必要投予的場合，投予後要十分的注意患者的狀態。
- e. 投予後患者稍保持安靜狀態10分鐘，注意觀察。
- f. 避免長期運用。

2. 禁忌：本劑或水楊酸系化合物(Aspirin等)、Chondroitin sulfate 過敏的既往歷患者。

3. 慎重投予：

- a. 本人或雙親、兄弟對此藥物有過敏、蕁麻疹、支氣管氣喘、過敏性鼻炎，或食物過敏等的患者。
- b. 肝或腎障礙的患者。
- c. 出血傾向的患者(血小板機能異常引起的)。
- d. 消化性潰瘍的患者。

4. 副作用：

- a. 休克：罕見休克現象，小心觀察，有胸內苦悶、血壓低下、顏面蒼白、脈搏異常、呼吸困難等現象的場合，馬上終止使用，並做適當的處置。
- b. 皮膚：罕見剝脫性皮膚炎、皮膚黏膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)，出現時小心觀察，如有此情況，要終止用藥。
- c. 過敏症：偶有發疹、浮腫、鼻炎樣症狀、結膜炎等的現象，有此場合要終止使用。
- d. 血液：罕見再生不良性貧血、白血球減少、血小板減少、貧血等的現象，要小心觀察，有此場合須終止，並做適當的處置。
- e. 精神神經系：耳鳴、重聽、眩暈等的現象，有此現象，減量或休藥等適當的處置。
- f. 罕見黃疸，GOT、GPT、AI-P上升的現象，有此場合終止使用。
- g. 腎臟：罕見腎障礙，有此場合終止使用。
- h. 消化器：胃痛、食慾不振、噁心、嘔吐、消化管出血等現象。
- i. 注射部位：偶有血管痛、麻痺感、發紅、搔癢感、腫脹等的現象。

5. 孕婦的投予：

- a. 因Sodium salicylate有動物實驗催畸報告，孕婦或可能懷孕的人不可投予。
- b. 水楊酸系製劑(Aspirin)投予妊娠末期的老鼠，曾有報告會減弱胎兒的動脈血管收縮。

6. 相互作用：增強Curmarin系抗凝血劑(Warfarin)，糖尿病用劑(Insulin製劑)的作用，於併用的場合，要減少醫藥品的用量，慎重投予。

7. 使用上注意：使用時讓患者橫臥，1Amp注射3分鐘以上，儘量緩慢靜注。

8. 室溫保存。

(包裝)

20mlx50Amp 盒裝。

安星製藥股份有限公司
新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號

①