“人人”回斯康錠

WASCON TABLETS-“GCPC”

衛署藥製字第 039649 號

本劑係以脹氣消除劑 Simethicone 配以適量之抗酸劑 Aluminum Magnesium Hydrate，Magnesium Oxide 而製成之驅氣消脹制酸製劑。服用後能使腸胃內之小氣泡，由於表面張力之影響而破裂，致氣體自然排出，腸胃道脹氣現象遁形消解，胃及十二指腸潰瘍、胃酸過多、腸胃道氣脹等症，服用本品均有效果。

成　分：Each tablet contains:

Simethicone……25mg

Aluminum Magnesium Hydrate……..282mg

Magnesium Oxide……..85mg

適 應 症：緩解胃部不適或灼熱感，或經診斷爲胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

注意事項：

(1) 爲防止兒童誤食請妥善保管。

(2) 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

(3) 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

(4) 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

警　語：

(1)除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

①對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過 **5g**。

②未滿 **3** 個月之嬰兒不得服用。

③本藥每日最大建議劑量之含鎂量超過 **50mEq(0.6g)**，腎疾患者不要服用。

④一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。

⑤制酸劑不得併用其他藥品。

(2)如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。

(3)消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

(4)本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。

(5)本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

用法用量：

成人及 12 歲以上，每次二錠，一天 3-4 次，或需要時服用，嚼碎後吞服。

6 歲以上未滿 12 歲，每次一錠。3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/2 錠。

3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

本產品單次劑量(每錠)之酸中和能力爲 5mEq 以上

鎂含量爲 9.35mEq

醫師藥師藥劑生指示藥品

包　裝：6～1000 粒塑膠瓶裝。

cGMP

人人化學製藥股份有限公司