



雪克定[®] 注射劑 (西華定)
Cekodin[®]-A Injection (Cephradine)

本品為一種口服與注射均能使用之最佳半合成頭孢子菌素 (Cephalosporin) 抗生素本品不含 Na⁺，適用於鈉鹽攝取受限制的病人(如高血壓、心臟衰竭、腎障礙者)。

【成份】 Each vial contains :

Cephradine(as
Arginine).....500mg(Potency).

Each Vial Contains:

Cephradine(as
Arginine).....1000mg(Potency).

賦形劑：無

【藥理作用】

1. Cephradine之作用機序為抑制細菌細胞壁之合成，對絕大多數革蘭氏陽性及陰性細菌都有顯著的殺菌性，也是一種在感染菌及其敏感度未經確定之前即可用來治療之一種抗生素。其胃腸之耐受性良好，即使腎臟機能不全的病人也可使用，副作用極少。
2. Cephradine不被乙內醯胺酶(Beta Lactamase)破壞，因此在治療由克雷氏菌引起的呼吸道感染、泌尿道感染、由流行感性桿菌或葡萄球菌引起之中耳炎、及皮膚及軟組織的感染可達90%以上之效果。
3. 藥物動力學:大部份在6小時內，多數以未改變的形態，排泄於尿中。以IM各別注射500mg、1gm在1-2小時內血中濃度約為6.14ug/ml。

【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具感受性細菌引起之感染症。

【用法用量】

成人:一次 0.5-1g，1日4次 IM 或 IV，每日最大劑量:8g

小孩:1日 50-100mg/kg，分4次注射。

本藥限由醫師使用。

【注意事項】

1. 對 Cephalosporin 類抗生素有過敏反應之病患，禁用本藥。
2. 對 Penicillin 類抗生素有過敏反應之病患，使用本藥時，須特加注意，可能會有部份交叉過敏性。
3. 本藥於動物試驗雖無催畸性，但對孕婦及胎兒之安全性尚未確立又本藥於授乳期會經母乳分泌出。
4. 使用本藥之病患，如果發生過敏反應，須立即停藥，並以強心劑、抗組織胺劑或副腎皮質素治療之。
5. 對嚴重腎機能減退者，使用本藥時，須先檢查，並給予投藥後之觀察，以防止本劑在體內之蓄積。
6. 副作用:對過敏體質病患(氣喘症、枯草熱)易過敏，長期使用易引起念珠菌感染。

【包裝】

500mg/Vial，1g/Vial，100 Vial 以下/盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司
SWISS PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新市廠：台南市新市區中山路182號