WET 1.1
衛署藥製字第039692號PIC/S GMP G-5191
衛部藥廠證字第(AP)0433067號

適用藥害救濟制度

"國嘉" 衛舒膜衣錠200毫克(舒林達酸)

Weisu F.C. Tablets 200mg "KOJAR" (Sulindac)

【成　　份】
Each F.C. Tablet Contains：
Sulindac.....200mg

【賦 形 劑】
Lactose、Cellulose Microcrystalline、Sodium Starch Glycolate、Sodium Lauryl Sulfate、Hydroxypropyl Cellulose、Magnesium Stearate、Croscarmellose Sodium、Hydroxypropyl Methylcellulose、PEG 6000、Carnauba Wax

【作　　用】
本品經口服吸收後主要之生化轉變有二:
1.爲可逆性的還元型Sulfide代謝物。
2.爲非可逆性的氧化型Sulfone代謝物
抗炎鎮痛作用顯著可能與Sulfide代謝物抑制Prostaglandin之生化合成有關。而非由於腦下垂體 - 腎上腺的刺激作用產生的消炎作用。
本品口服約90%被吸收，空腹服用2小時，飯後服用約3~4小時具活性的Sulfide代謝物可達最高血中濃度，Sulindac平均半衰期是7.8小時，而Sulfide代謝物之半衰期可長達16.4小時，故抗炎作用持久，一天服用二次，Sulindac和其Sulfone代謝物經肝內循環而產生Sulfide的相關代謝物，這可能是有效藥物在血液中維持長久的原因。
本品主要經尿排泄以Sulindac及Sulfone代謝物(游離及Glucurone結合)約50%由尿排出，而Sulfide代謝物的排出不超過1%，約25%發現在大便中，與製酸劑 Magnesium 及 Aluminum Hydroxide 併服其藥效不受影響。

【適 應 症】
下列疾患引起症狀之消炎、鎮痛(變形性關節炎、慢性關節炎、腰痛症、肩關節周圍炎)。

【用法用量】
通常成人1天2次，1次1錠，飯後服用。最大劑量，一天2錠，可依病人情況調整用量及使用時間。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】
1.對本劑過敏者，授乳婦及服用Aspirin或其他類固醇抗炎劑而引起急過敏者禁用本劑。孕婦及授乳者，安全性尚未建立，故應儘量避免使用本劑，本劑用於小兒科尚在研究中。
2.長期使用本劑者，宜定時作肝功能檢查。
3.服用本劑偶會導致胃潰瘍(1/250)及腸胃出血(1/600)，故對於胃潰瘍或腸胃出血病患或有往歷者，當衡量使用本劑之利害對於病患密切注意，本劑偶亦會產生胃腸道疼痛、消化不良、噁心、嘔吐、下痢、便秘、厭食、氣脹之胃脹症狀。
4.本劑比Aspirin對於血小板功能及出血時間影響少，但亦小心觀察為宜，極少數會造成血小板減少症、白血球減少症、再生不能性貧血、流鼻血。
5.本劑可造成暫時性肝功能不正常，需予注意至正常為止，若明顯地持續不正常就需停藥。少數病患偶會出現黃膽、肝炎、膽汁滯鬱。
6.本劑主要由尿液排除，故肝功能不全者當注意，可減量以防堆積。使用本劑少數有水腫、心悸、血壓升高之現象，故高血壓或心臟功能不全者，使用當注意。
7.本劑偶會造成皮膚搔癢、紅腫、口腔炎、眩暈、頭痛、耳鳴、聽力障礙、神經炎之副作用。
8.本劑與口服抗凝血劑或口服降血糖劑併用，未發現有相互作用但需注意至確定無影響為止。與Probenecid併用，本劑血中濃度微升高，而Probenecid尿酸排泄作用略降，但皆不明顯。本劑盡量避免與Aspirin併用，但與Propoxyphen HCl或Acetaminophen併用皆不互相影響。

【包　　裝】
4~1000錠塑膠瓶、鋁箔盒裝。

【儲　　存】
室溫避光保存(25°C)。

PIC/S GMP
國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3
臺中市大甲區日南里工十路2號
服務專線：(04)26816197