華興製藥

鼻腔、支氣管炎解除劑

"華興" 伊佳麗 錠 60 毫克

Egolder Tablets 60mg "H.S."

衛署藥製字第 039788 號（G-5244）

【主要成分】
每錠中含有：
Pseudoephedrine Hydrochloride.....60mg

【賦 形 劑】
Glyceryl Behenate、Mannitol、Calcium Phosphate Dibasic、Colloidal Silicon Dioxide、Sodium Starch Glycolate、Hydroxypropyl Cellulose、Magnesium Stearate、Talc.

【作　　用】
本品爲一擬交感神經藥，其藥理作用與Ephedrine相似，但臨床上對血壓上升，瞳孔放大，以及心臟和中樞興奮等副作用遠較Ephedrine爲弱。
本品對於解除呼吸道上粘膜充血，鼻粘膜充血以及支氣管氣喘，支氣管痙攣有獨特之療效。

【適 應 症】
充血性鼻炎、支氣管炎、支氣管氣喘。

【用法用量】
通常成人每4小時1錠(60mg)一天不超過4錠(240mg)爲宜，小孩每天每公斤體重4mg，分做4次服用。

本藥須由醫師處方使用

【注意事項】
(1) 對於擬交感神經藥(如Ephedrine, Epinephrine, Isoproterenol, Metaproterenol, Norepinephrine,Phenylephrine,Phenylpropanolamine)有過敏之患者及授乳婦請勿使用。
(2) 與下列藥物有相互作用，應愼重使用：
β-adrenergic blockers,Digitalis glycosides,Guanethidine,Mecamylamine, Methyldopa,Reserpine,Veratrum alkaloids,MAO Inhibitors,Tricyclic antidepressants,及其他擬交感神經藥。
(3) 有下列症狀之患者請小心使用：
心血管性疾患、冠狀動脈疾患、糖尿病、青光眼、高血壓、甲狀腺機能亢進、前列腺肥大。
(4) 本品之副作用：
偶有排尿困難、耳鳴、頭痛、噁心、嘔吐、震顫、發汗、目眩、不眠、心悸亢進、神經過敏、大量給藥將會引起幻覺及心律不整。

【儲　　存】
30℃以下儲存。

【包　　裝】
6～1000錠PTP鋁箔盒裝。

藥商、製造廠：
華興化學製藥廠股份有限公司
彰化縣田尾鄉饒平村四維巷128號
服務專線：(04)8832121～6