貼利康®

TEH LI KON
WIN KAN SIP PLASTER

溫感藥布

溫感藥布・消炎・鎮痛PAP劑

經衛生福利部核定為 PIC/S GMP 優良藥品貼布劑
衛署藥製字第039800號 G.M.P. G-5251

【特點】
本品適用於肩痠痛、腰痛、關節痛、筋肉痛、筋肉疲勞、打撲、捻挫、等諸症狀。敷貼於患部，極具清涼感，為一作用迅速之消炎鎮痛巴佈劑。本品採用高含水性基劑，能使患部立即產生冷卻效果，迅速滲入皮下組織深處，短時間即可發揮顯著之藥效。

【成分】
有效成分及含量：每16g(10cmx14cm)中含有：

Glycol Salicylate	**240mg**
DL-Camphor	**80mg**
DL-α-Tocopherol Acetate	**48mg**
Capsicum Extract	**32mg**

其他成分(賦形劑)：
Purified Water, Glycerin, PVA Solution, Sodium Polyacrylate, Sorbitol Solution, Nikasol TS-620, Kaolin, Carboxymethylcellulose Sodium, Sodium Polyacrylate Starch, Tween 80, Nonion OP-80R, Titanium Dioxide, Tartaric Acid, L-Menthol, Aerosil 200, Allura Red AC

【用途(適應症)】暫時緩解局部疼痛。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【包裝】1.16g(10cm×14cm)×5片/ 鋁箔袋裝。
2.本藥應儲存於30℃以下。

【不得使用族群】對本藥成分過敏的人(包含藥品成分與賦形劑成分)。

【諮詢專線】0800000658

總經銷：三正貿易有限公司
台北市洛陽街9號9樓之9

製造廠：得生製藥股份有限公司二廠
台南市永康區環工路42-1號

製造批號：
保存期限：

固定用透氣粘網使用方法

1.先將粘網印有字體之面，依前頭方向撕下。
2.將藥布之布面黏著於黏網上，依前頭位置黏貼。
3.再將藥布上之透明紙撕下。
4.將黏有黏網之藥布貼於疼痛之部位即可。

【使用上注意事項】
1.有下列情形者，請勿使用：
- 對本藥成分過敏的人(包含藥品成分與賦形劑成分)。

2.有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
- 深部皮膚組織感染。

3.有下列情形者，使用前請先諮詢醫師或藥師、藥劑生：
- 2歲以下。
- 曾對藥品或化妝品有過敏症狀(皮膚起疹子、紅斑、搔癢等)。

4.其他使用上注意事項：
- 請勿用於：眼睛四周，有黏膜的地方(如眼睛、生殖道)、出現紅疹或有搔癢的地方、傷口處。
- 本藥品避免使用在大面積(大於使用者兩個手掌的面積)感染的地方。
- 嚴守使用方法。
- 本藥品必須置於兒童(12歲以下)拿不到的地方。
- 兒童(12歲以下)必須在成人的協助下使用。
- 為了確保品質，未使用之貼片應置於袋內，並將拉鍊密閉。
- 避免陽光直射，保存在室內乾燥的地方。

【用法用量】

次數	依患部情況給予適當增減使用，次數通常一日1~2次貼於患部。慢性疾患或疼痛嚴重的人，可一日換貼2~3次。
方式	● 切割成適當大小，剝去表面薄紙，貼於患部使用。 ● 患部有濕汗或汙垢時會減少膏面之黏著，使用前請先將患部清洗並拭乾以增強黏著性及藥效。 ● 於關節等易脫落的部位，可用黏著性膠帶或伸縮繃帶固定。

【警語】
1.使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師或藥師、藥劑生。

身體部位	症狀
皮膚	灼熱感、刺痛、紅斑
呼吸道	嗆暈、刺激性咳嗽

2.使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。
- 自覺狀況未改善或更惡化。

請由此剪開

拉鍊