

怡腦坦持續性膜衣錠 400 毫克

Ipentol Controlled-Release F.C. Tablets 400mg

【成分名】 Pentoxifylline

【劑型、含量】

持續性膜衣錠：每錠含 Pentoxifylline 400mg

【臨床藥理】

Pentoxifylline 可促進末梢血液循環，作用複雜且尚未完全明瞭。口服吸收良好。

吸收後很快經肝臟代謝(First-pass effect)成多種不同代謝物。主要由尿中排泄。

【適應症】

末梢血管循環障礙。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

1. 通常成人劑量，一天 3 次，每次 100~400mg，伴著些液體整粒吞服與食物共服。若病人有出現胃腸或中樞神經的副作用時，則其劑量應減量，如果其副作用仍然持續，則停止服用。
2. 雖然在治療 2~4 週後，即會出現療效，但仍須持續治療八週以上。
3. 有低血壓，血壓不穩的患者或腎功能不良者，須調整個別劑量。

【注意事項】

1. 腎功能不全之患者，Pentoxifylline 廓清率降低，可能引起毒性，需減少劑量。
2. 對 Pentoxifylline 有敏感性的病人不可服用此劑。
3. 有視網膜出血或急性心肌梗塞及懷孕中的婦女不可服用本劑。
4. Pentoxifylline 和其它代謝物會排泄於乳汁中。老鼠實驗中有引起腫瘤的可能，應依此藥對母親之重要性審慎評估。
FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數): C
5. 18 歲以下兒童安全性尚未建立。
6. 禁忌：對 Pentoxifylline 或 Methylxanthines(如 Caffeine、Theophylline、Theobromine)過敏者禁用。

【相互作用】

Pentoxifylline 會延長 Prothrombin time，增加出血機會。因此使用 Warfarin 的病人要時常監測 PT。有出血傾向者要定期檢驗血液實驗值(包括血紅素、血比容)。

【副作用】

1. 一般症狀可能有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈(碰到這些症狀，須作

適量的劑量調整)。

2. 皮膚潮紅、心跳加快，胸氣塞或低血壓(這些副作用可能是因為高劑量的服用，須將劑量減低，作適量調節)。
3. 少數副作用例子有搔癢、蕁麻疹、血管神經性水腫(這些副作用作適量的劑量調節即可)。
4. 本藥中毒之症狀與劑量有關，通常出現於服用 4~5 小時後並持續 12 小時。症狀有潮紅、低血壓、緊張、興奮、顫抖、痙攣、嗜睡、意識喪失、發燒和激動。
5. 治療：洗胃並使用活性碳。監測心電圖與血壓。除了症狀治療外，維持呼吸與血壓，治療心律不整並控制痙攣。

【儲存條件】

室溫下儲存。

【賦形劑】

Hydroxyethyl Cellulose, Povidone K-30, Magnesium Stearate, Ethylcellulose, HPMC 615, PEG 6000, Titanium Dioxide, Erythrosine Aluminum Lake,

【包裝】

4-1000 錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 039858 G-5278 號

委託者：健喬信元醫藥生技股份有限公司
新竹縣湖口鄉光復北路 21 巷 4 號
製造廠：優良化學製藥股份有限公司
新竹縣湖口鄉中興村光復路 10 號