


正和商標



正確藥效

廣效性口服抗菌劑

“正和”若富新 膜衣錠200毫克(諾弗酒辛)

N.F.S. F.C. Tablets 200mg "C.H." (Norfloxacin)

本劑係最近研究開發之Pyridone Carboxylic Acid系的廣範圍經口抗菌劑。

本劑係在Quinolinecarboxylic Acid的第6位導入氯，第7位導入Piperazine與既存的Pyridone Carboxylic Acid系藥劑比較，抗菌範圍擴大至革蘭陽性菌，再者，對於革蘭陰性菌的抗菌力亦強一級。尤其是對於綠膿桿菌，鋸桿菌屬(Serratia)，更顯示強大的抗菌力。

本劑服用後，以高濃度向各臟器移行，幾乎皆以未變化體，原封不動由尿中及膽汁中排泄出來。

臨牀上認定對於上呼吸道感染症、皮膚感染症、膽道感染症、赤痢菌引起之腸道感染症及耳鼻科領域感染具優越的治療效果。

※作用：葡萄球菌屬，鏈球菌屬，腸球菌(Enterococcus)，肺炎球菌，大腸桿菌，枸櫞桿菌屬(Citrobacter)，克雷白氏桿菌屬(Klebsiella)，腸內桿菌屬(Enterobacter)，鋸桿菌屬，普通變形桿菌(Proteus Vulgaris)，奇異變形桿菌(Proteus Mirabilis)，摩干氏變形桿菌(Proteus Morganii)，雷極氏變形桿菌(Proteus Rettgeri)，綠膿桿菌，流行性感冒嗜血桿菌(Haemophilus Influenzae)，淋菌，沙門氏桿菌屬(傷寒菌及副傷寒菌除外)，志賀菌屬，霍亂菌之中的本劑感性菌所產生的下列感染症：

毛囊(包)炎(含膿毒性痤瘡)癤、癰、傳染性膿痂疹、蜂巢炎、皮下膿瘍、感染性粉瘤、咽喉頭炎、扁桃炎、腎盂腎炎、膀胱炎、急性支氣管炎、前列腺炎、淋菌性尿道炎、膽囊炎、膽管炎、細菌性赤痢、腸炎、霍亂、中耳炎及副鼻腔炎等。

※成份：Each F.C. Tablet Contains:

Norfloxacin..... 200mg

※適應症：表淺性皮膚感染，泌尿道感染及赤痢菌引起之腸道感染。

※用法用量：通常成人一回100~200mg，一日3~4回經口服用，並依症狀適宜增減。

本藥需由醫師處方使用。

副作用報告顯示Floroquinolone類抗菌劑可導致肌腱炎或肌腱斷裂，若有肌腱疼痛、發炎、斷裂之情形，應立即停藥。

※注意事項：1.下列患者，不得服用：對於本劑有過敏症既往歷的患者。

2.下列患者，慎重服用：有高度腎障礙的患者。

3.副作用：

(1)過敏症：偶有發疹、發赤、搔癢感等之過敏症狀，但極少發生。有這種症狀時，應立即停藥。

(2)腎臟：偶有BUN，血中Creatinine上升。又由類似化合物(Piromidic Acid)之服用，有發現疑為腎臟障礙的症例之報告。

(3)肝臟：偶有SGOT，SGPT，ALP，血清Bilirubin值之上昇。

(4)消化器官：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、腹痛、腹部膨脹感、下痢、又偶有便秘、口唇炎、口角炎等症狀出現，但極少發生。

(5)血液：偶有嗜酸球增多，白血球減少、又偶有紅血球減少、血紅素減少出現，但極少發生。故應注意觀察，認為有異常時，即停藥。

(6)其他：偶有眩暈、頭痛、又偶有不眠，全身倦怠感、麻木感、冷感、熱感、浮腫、心悸亢進、胸痛出現，但極少發生。

4.對孕婦，授乳婦的服用：由於有關妊娠中與授乳中服用之安全性尚未完全確立，故對於孕婦，有妊娠可能性的婦人，及授乳中的婦人，應判斷治療上的有益性超過危險性時，才能服用。

5.對小孩服用：對小孩服用之安全性尚未完全確立(尚無使用經驗)。

6.對臨床檢查值的影響：會影響麝香草酚濁度試驗(Thymol Turbidity Test, T.T.T)的檢查值。(外表上呈低值)。

7.其他：依動物實驗(幼犬)，認為可能有關節異常的現象。

※警語：本藥品具有使重症肌無力惡化之風險，具有重症肌無力患者應避免使用。

※貯存方法：置於25°C乾燥處，避光儲存。

※包裝：6~1000錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

※賦形劑：Prejel、Primojel、Powdered Cellulose、Lactose Monohydrate、Magnesium Stearate、Talc、HPMC、PEG。

衛署藥製字第039945號

正和製藥股份有限公司新營廠

臺南市新營區新工路23號(新營工業區)