衛署藥製字第039947號

"安星"心舒寧錠20毫克
Sinsulin Tablets 20 mg "Astar"

【成　分】每錠含：

Oxazolam.....20 mg

【賦形劑】

Lactose、Sodium Starch Glycolate、Povidone、Sunset yellow FCF、Magnesium Stearate。

「臨床藥理」：

1. 對於(mouse、hamster、rat、monkey)衝突反應、狂暴性、攻擊性、興奮等的實驗動物情緒障礙之抑制作用(靜隱作用、馴化作用)很明顯，另一方面，催眠、肌肉遲緩、步行失調等的自發性行動抑制作用較弱(mouse)，條件迴避反應的抑制也較少(rat)。
2. 關於靜隱作用，從貓、兔子的實驗中，推定某其係特異的作用在扁桃核下視丘之大腦邊緣系的結果。對於人體意識水準的變化，檢討顯示腦的興奮水準的光－眼輪肌肉反射的影響，並無抑制作用，對於腦幹網樣體－新皮質賦活性(意識水準)幾乎無影響。
3. 對於經由Megimide、Pentetrazol引起陣發性痙攣(mouse、rat)，振動誘發痙攣(Elmouse)有抑制效果。

「藥物動力學」：

依文獻資料：健康成人七例中，空腹時一次經口投與20mg後的血液中，均有變化物質，其主要代謝物是 N-desmethyldiazepam，尿中主要代謝物是 2-amino-5-chlor- 4-hydroxybenzophenone(ACHB)和其共軛體及 2-amino-5-chlorobenzophenone(ACB)。

「適應症」：

焦慮狀態。

「用法用量」：

本藥須由醫師處方使用

1. 治療時，通常成人每次10~20mg，每天3次。
2. 麻醉前投藥時，通常手術前每kg體重以1~2mg口服。
3. 視年齡症狀，可適宜增減。

「注意事項」：

一般注意：

1. 因為會引起嗜睡、注意力、集中力、反射運動能力降低，故儘量不要從事開車等伴有危險性的機械操作。

2. 使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生的藥品相互作用。

禁忌：

1. 急性狹角性青光眼(急性狹隅角緣內障)之患者。重症肌無力症之患者。
2. 慎重服用：心臟病、肝病、腎病之患者、腦部功能障礙者、嬰兒、小孩、衰弱病患、中等度或嚴重的呼吸不全患者、高齡者(請參照高齡者的投與)。

對孕婦的投與：

1. 據免疫學之調查報告，懷孕中病患，投與其他的Benzodiazepine系化合物時，和對照群比較之下產生畸形兒等之殘障兒比例非常的多，故孕婦(3個月以內)只能在被判斷治療上有益，且在挽救危機時服用。
2. 據報告，服用Benzodiazepine系化合物(Diazepam、Nitrazepam)會使新生兒發生哺乳困難、肌張力降低下、嗜眠、黃疸的增強等症狀。故懷孕後期的婦女只能在被判斷治療上有益，且在挽救危機時服用。
3. 因有其他Benzodiazepine系化合物(Diazepam)，移行至母乳中引起新生兒嗜眠，體重減輕等之報告，而也會有黃疸增強的可能性，所以授乳婦要避免服用。
4. 因有其他Benzodiazepine系化合物(Diazepam)，在分娩前連續服用時，出生後的新生兒有出現禁斷症狀(神經過敏、震顫、過度緊張等之報告)。

對高齡者的投與：

因對高齡者的投與，很容易出現運動失調等副作用，故開始時應從少量慎重服藥。

相互作用：

和下列藥品併用(Phenothiazine類衍生物、Barbiturate類衍生物等中樞神經抑制劑、MAO Inhibitors)或是酒精類會增強其作用。

「副作用」：

1. 依賴性：Benzodiazepine系化合物大量連續服用時，偶而會引起藥物依賴，因有此報告，故對本藥的投與需詳細的慎重觀察，不可過量，長期服用如需停藥時，則需注意要慢慢的進行減量。
2. 精神、神經系統：有時會有睡意、蹣跚、頭昏、頭痛、失眠、舌頭不靈活，偶而也會有焦急不安定的現象出現。
3. 循環系統：麻醉前投藥偶而會有頻脈現象。
4. 消化系統：有噁心、便秘、食慾不振、胃部不舒服、下痢、口渴之現象、偶而也會有嘔吐之現象。
5. 過敏症：如有發疹、蕁麻疹等過敏症狀出現時請停止服藥。
6. 骨骼肌：有時會有倦怠感等肌張力降低症狀。

包　　裝：3～1000錠塑膠瓶裝。

貯存條件：30℃以下避光儲存。

安星製藥股份有限公司

新竹縣新豐鄉鳳坑村坑子口673號