衛署藥製字第 039972 號 C-GMP-G-5343

適用藥害救濟制度

“國嘉”克敏定錠 1 毫克

Keminding Tablets 1mg“KOJAR”

本品在如血管和非血管的平滑肌，唾液腺和呼吸道黏膜腺體等的 H1 接受體部位，會與組織胺產生競爭性的阻斷作用，同時具有抗膽鹼激性（如口乾）和鎮靜的作用。

【主 成 份】

每錠含：

Clemastine Fumarate 1.34mg

（相當於 Clemastine 1mg）

【適 應 症】

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢）及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

【用法用量】

一日 2 次。成人每次 1 錠， 12 歲以上適用成人劑量。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

1.爲防止兒童誤食請妥善保管。
2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3.除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警　　語】

1.服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見）。
2.除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。
3.除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。
4.除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。
5.老年人應小心使用本藥， 3 歲以下不建議服用。
6.如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。
7.服用本藥不得與酒精性飲料合用。
8.除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
9.服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
10.連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。
11.不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用（如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等）。
12.使用於 12 歲以下之患者前，請先詢問醫師。

【包裝及儲存】

4-1,000 錠塑膠瓶裝、 PTP 鋁箔盒裝，防濕、室溫（15-30℃）避光保存。

C-GMP

國嘉製藥工業股份有限公司
KOJAR PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

台中市大甲區幼獅工業區青年路 155 號
服務專線：(04) 26816197