十全藥品

衛署藥製字第040047號
G-5362號

降血糖劑

"十全"得利糖錠500毫克(二甲二脈)

Bentomin Tablets 500mg "S. C." (Metformin)

【成　　分】：Each tablet contains：
Metformin HCl.....500mg

【作　　用】：
Metformin HCl可延緩腸道吸收葡萄糖，促進周邊組織對葡萄糖的吸收，以及抑制肝臟葡萄糖的新生作用。

【適 應 症】：糖尿病。

【用法·用量】：本藥須由醫師處方使用。

1. 開始治療每天2～3次，每次1錠500毫克，必要時可以每天3次，每次增至1公克，可能需要服用兩星期始達控制效果，病情穩定後將劑量降低至維持量，進餐中服用。
2. Metformin之每日最高治療劑量為3GM。
3. 大於80歲之老年患者不建議開始使用Metformin治療。
4. Metformin用於治療80歲以下之老年患者時，應特別謹慎。
5. 腎絲球體過濾率(eGFR)介於30-45ml/min/1.73m^{2}應減量使用。

【副 作 用】：

1. 因本藥會貯存在胃腸道粘膜，過敏性患者會有胃腸道障礙，如下痢、食慾不振、噁心、嘔吐、腹痛、發疹等，故本藥應在進食中或餐後服用。
2. 65歲以上老年患者較易產生乳酸中毒。

【禁　　忌】：

1. 有酸中毒病歷者，因有乳酸中毒的危險性。
2. 有下列症狀者亦不宜服用：腎功能衰竭；心血管疾病(如冠狀動脈不全、心肌梗塞及高血壓)；與組織缺氧有關的症狀(如壞疽、循環休克、急性失血)；肺栓塞；嚴重肝壞死；胰臟炎；酗酒者及服用利尿劑者。
3. 臨床上雖無任何畸胎影響之可能性，但妊娠期仍以勿用為宜。
4. 腎絲球體過濾率(eGFR)小於30ml/min/1.73m^{2}禁用。

【警　　語】：

Metformin有導致代謝性酸中毒(例如：乳酸中毒)之風險，醫療人員宜提醒病患該不良反應，倘若出現代謝性酸中毒之不良反應，應立即停藥並回診開立處方之醫師。

【注意事項】：

1. 靜脈注射顯影劑有導致急性腎功能下降之危險，因此醫師為病患注射顯影劑應先停用Metformin，且需確認病患術後之腎功能恢復正常，才能再開始使用該藥品。
2. 醫師為病患處方Metformin時，需定期監測其腎功能。

【賦形劑】：Lactose, Stearic Acid, Povidone, Talc。

【包　　裝】：4～1000錠塑膠瓶及鋁箔盒裝。

十全實業股份有限公司
公司：南投市南崗工業區仁和路27號
電　　話：(049)2254221-3
服務專線：(049)2254615
訂購專線：0800-491666
傳　　真：(049)2254617