"永勝"百勝感冒液
Bisun Anti-cold liquid "EVEREST"

本品為優秀綜合感冒治療劑，主治感冒引起的各種症狀：頭痛、流鼻水、咳嗽，六種成分相輔相成，促進感冒之康復，效果極佳。

【成　　分】：每毫升含

Acetaminophen……8.33mg
Chlorpheniramine Maleate……0.07mg
DL-Methylephedrine Hydrochloride……0.275mg
Caffeine Anhydrous……1.25mg
Guaiacol Glyceryl Ether……2.08mg
Dextromethorphan Hydrobromide……0.4mg

【作　　用】：

1. Acetaminophen：具解熱、鎮痛作用，效果迅速。
2. Chlorpheniramine Maleate：對於各種過敏性疾患的預防及治療有效，可抑止流鼻水、鼻塞、打噴嚏等過敏性症狀。
3. DL-Methylephedrine Hydrochloride：刺激交感神經，擴張支氣管平滑肌，用於支氣管氣喘、發炎、咳嗽。
4. Caffeine Aanhydrous：興奮大腦皮質，增加活動力，可減低倦睡及疲勞，緩和頭重。
5. Guaiacol Glyceryl Ether：為合成鎮咳祛痰劑、鎮咳作用急速，無中樞鎮靜作用，且能增加氣管內分泌物之排泄，有顯著之祛痰作用。而對支氣管平滑肌有抗痙攣作用，亦有抗組織胺作用。
6. Dextromethorphan Hhydrobromide：為非麻醉性鎮咳劑，直接作用於咳嗽中樞，無鎮靜或食慾不振，且無習慣性。

【適 應 症】

感冒諸症狀（流鼻水、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、發熱、頭痛）之緩解。

【用法用量】

一天服三次。一次量成人 20ml，15-11 歲 13ml，11-8 歲 10ml，8-5 歲 7ml，於飯後 30 分鐘以內服用。醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

1.避免重複使用感冒藥，解熱鎮痛藥、鎮咳去痰藥、抗組織胺藥及鎮靜劑。
2.請放置小孩伸手不及處。
3.服用本劑欲睡者，避免開車或操作機械。
4.如服用數次未改善症狀時，請停止服用。
5.本劑含有劇藥，務必按照所定服用方法及劑量使用。
6.避免陽光直射，置於陰涼處。

【警語】

1.肝毒性：

(1)使用 acetaminophen (paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日 4,000 毫克的 acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 acetaminophen 成分之藥品。

(2)過量服用 acetaminophen 可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有 acetaminophen 成分之藥品，因而造成用藥過量。

(3)有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 acetaminophen 期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有 acetaminophen 或 paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過 4,000 毫克的 acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

2.與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

3.過量：

(1)服用過量 acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。

(2)本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。

(3)Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後 48~72 小時才明顯可見。

4.過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用 acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對 acetaminophen 過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

5.嚴重皮膚反應：使用 acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病（Acute Generalized Exanthematous Pustulosis , AGEP）、史蒂文生氏-強生症候群（Stevens - Johnson Syndrome, SJS）和毒性表皮壞死溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis, TEN）。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

【賦 形 劑】：Sucrose、Caramel、Dehydroacetate Sodium、Citric Acid、70% Sorbitol Liquid、Cherry(Flavor)、Purified Water。

【儲存條件】：25℃以下、遮光保存。

【包　　裝】：20～4000 公撮塑膠瓶、玻璃瓶裝。

衛署藥製字第 040069 號

永勝藥品工業股份有限公司
EVEREST
嘉義頭橋工業區工業三路6-3號
諮詢電話:05-2218686(代表號)