



"瑞士"

痛舒膜衣錠 750 公絲

Disal F.C. Tablets 750mg "SWISS"(Salsalate)

衛署藥製字第 040100 號 G-5391

本品為水楊酸類製劑，在酸性胃液中幾乎不溶解，溶解度(0.1mg/ml)，不過在小腸中很快溶解，大部分以原型被吸收，僅有一小部份被水解成 2 分子的 Salicylic Acid。本品不同於 Aspirin 不會對血小板凝集造成不好影響，和 Aspirin 對照比較：本品不易導致胃腸道出血。且本品每天服用二次即可維持足夠的治療血中濃度(10-30mg/100ml)

「成分」：Each F.C tablet contains:

Salsalate 750mg

「藥理作用」：

一、藥動學：

1. 本品約 13% 以葡萄糖醛酸結合態化生物經腎排出，其餘部份則以 Salicylic Acid 及其它代謝物方式排出。酸性藥物或食物將降低尿中排泄率且延緩吸收。
2. 水楊酸的生體轉化過程功能在治療劑量下是飽和的，因此在生體轉化率的限制下，使得原有的半衰期延長至 3.5!-16 小時或是更久。故本品每天服用二次，即可維持足夠的治療血中濃度(10-30mg/1000ml)。

二、作用機轉：

和其他 NSAIDs 相同，本品抗炎作用模式仍未完全明瞭，本品主要代謝物雖然在體外 Salicylic Acid 是前列腺素(Prostaglandin)生合成的弱抑制劑，不過本品在體內可選擇性抑制前列腺素(Prostaglandin)生合成而產生抗炎活性，作用相當於 Aspirin 及 Indomethacin。

「適應症」：

風濕性關節炎、骨關節炎。

「用法用量」：

成人:1 日 3mg，分 2 次於飯後服用，一次服用 2 粒。老年人應降低劑量。本藥須由醫師處

方使用。

「注意事項」：

一:禁忌:

1. 禁用於對水楊酸類有過敏症狀者。
2. 對於感染天花、水痘、流行性感冒等病毒之患者，不宜服用本品，以避免引起 **Reye's Syndrome**。
3. 孩童:推薦劑量和適應症尚未確定。年齡小於 12 歲以下之孩童不宜服用本品，以避免引起 **Reye's Syndrome** 之發生。

二:本品治療期間不併用其它 Salicylate 藥物以避免可能過量。

三:副作用:耳鳴、聽力受損(可逆性的)、發疹、眩暈、支氣管痙攣。

四:藥物相互作用：

1. 水楊酸類與抗凝血劑同時服用容易導致系統性出血。
2. 水楊酸類可提高降血糖劑中的 Sulfonyleurea 類之降血糖作用。
3. 水楊酸類製劑會和下列藥物競爭蛋白結合位：
Penicillin、thiopental、thyroxine、triiodothyronine、phenytoin、sulfonpyrazone、naproxen、warfarin、methotrexate 亦可能和 **corticosteroids** 競爭。

五:老年人降低劑量可避免一般的副作用如:聽覺。

「包裝」：

8~1000 錠/塑膠罐裝、鋁箔盒裝。

Code No:STDITD21

瑞士藥廠股份有限公司

SWISS PHARMACEUTICAL CO. LTD.

台南縣永康市四維街 164 號