



糖尿病治療劑

GXT-005  
衛署藥製字第040233號

“永信”

糖立朗<sup>®</sup>  
錠 5毫克

Glix<sup>®</sup>  
(Glipizide) Tablets 5mg "Yung Shin"



3.98cm

糖立朗錠所含之主成分-Glipizide乃為Sulfonylurea類之糖尿病治療劑，除了具有良好的降血糖作用之外，亦擁有高度的安全性。本藥對於糖尿病的療效已有多項研究加以証實，並廣受臨床之使用。

【成分】每錠中含：

Glipizide.....5mg

【賦形劑】

Lactose、Microcrystalline Cellulose、Polyvinylpyrrolidone、Colloidal Silicon Dioxide、Sodium Starch Glycolate、Stearic Acid Fine Powder。

【作用】

1. 本藥為結構隸屬於Sulfonylurea之口服降血糖劑，其作用為經由刺激胰臟之β-細胞而分泌胰島素(Insulin)，當人體投與Glipizide後可藉由刺激Insulin的分泌而產生迅速的降血糖效應。
2. 對於曾接受其他Sulfonylurea降血糖藥物治療，但效果不佳的患者，本藥對其仍具療效。
3. 臨床研究顯示，Glipizide除了可有效控制血糖之外，同時不影響患者之血中脂質濃度。
4. 本藥投與後可迅速由胃腸道被吸收，並於1~3小時內到達最高血中濃度，排除半衰期為2~4小時。食物會延緩本藥之吸收，但總吸收率則不受影響。
5. 本藥主要於肝臟進行代謝，大多以非活性化代謝物由尿液中排除。
6. 經由長期的動物實驗結果顯示，Glipizide的毒性極低，而臨床試驗中也証實本藥對成年型糖尿病的有效性與安全性，即使長期服用後仍保有相同的療效與耐受性。

【適應症】

糖尿病。

【用法·用量】

依定期對尿糖及血糖的測定結果來調整。一般而言，治療劑量為每日2.5~20mg(即1/2~4錠)，於用餐前30分鐘投與。

- 初次治療之患者：2.5~5mg於早餐前服用；逐漸增加至控制血糖所需劑量。
- 已使用過其他口服降血糖劑之患者：依據病患臨床新陳代謝之狀況及以往治療狀況而定，在嚴密監督下，由低劑量而逐漸增加至所需劑量為止，有時在新舊藥更換期間必須短暫的停藥。
- 使用Insulin治療之患者：部份患者，當加入本藥時，Insulin之量必需減少，並於治療初期，經常檢查血糖值。

當每日投與劑量高於15mg時，須分成二次或更多次投與，而每日最高劑量為40mg。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

1. 曾對本藥產生過敏反應之患者。
2. 糖尿病性酮酸中毒。
3. 糖尿病性昏迷。

【一般注意】

1. Sulphonylureas類的口服降血糖劑，僅限用於具有症狀、非酮原性(Ketogenic)、非由食物可單獨控制，不須Insulin治療的成年型糖尿病。萬一低血糖發生時，請服用醴類(糖)。
2. 曾有研究報告顯示，Sulfonylurea藥物與酒精併用後可能出現戒酒樣(Disulfiram-like)症狀。
3. 在本藥治療期間，當體力衰弱、不尋常的過度運動、不規則進食、喝酒或肝、腎機能不全時，可能偶有血糖過低的現象發生。

【孕婦、授乳婦之投與】

本藥品使用於孕婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。又本藥不建議授乳婦使用，因此一旦停藥後可考慮採用Insulin治療。

【使用後之注意】

本藥服用後，若發生過敏或不適現象(如發疹、瘙癢等)，請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副作用】

胃腸系統：主要為噁心、下痢及便秘，而且大多與服用劑量有關，通常降低劑量或分次投與即可改善。

皮膚方面：暫時性的過敏反應，持續治療後症狀通常會消失。

血液方面：罕見且可逆性之造血系統發生改變。

其他：短暫之頭痛、眩暈及嗜睡現象。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

2~1000錠塑膠瓶、PTP鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2149184

