

cGMP 優良藥品

“順生”莫咳錠 20 毫克（梯比匹定）  
Asdin Tablets 20mg “S.S.P” (Tipepidine)

**成 份：**Each Tablet contains :  
Tipepidine Hibenazate.....22.14 mg  
(eq. to Tipepidine citrate.....20 mg)

**作 用：**本品為鎮咳藥。  
本品有抑制延髓之咳嗽中樞，降低咳嗽之感受性，而具鎮咳作用。並可促進支氣管腺分泌及呼吸道絨毛上皮運動而有祛痰作用。

**適 應 症：**鎮咳。

**用法用量：**一天 3 次，成人每次 1 錠，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 1/2 錠；3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/4 錠；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。  
醫師藥師藥劑生指示藥品。

**【注意事項】**

- 1.為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
- 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4.勿超過建議劑量。
- 5.服藥後若有不適情況發生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 6.本藥不得與含酒精飲料併服。

**【警 語】**

- 1.吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患（包括如慢性支氣管炎、肺氣腫）所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。
- 2.有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
- 3.除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
  - a.3 歲以下，請洽醫師診治。
  - b.曾因本藥物引起過敏症狀者不得使用。

**包 裝：**6~1000 錠塑膠罐裝、PTP 鋁箔盒裝。

**避 光：**貯存於 25°C 以下。

衛署藥製字第 040373 號 G-5497

Code No. PT-80

**順生製藥股份有限公司**

彰化市茄南里茄苳路一段 245 巷 22 號