"美時"

福流® 400毫克（配妥西菲林）持續釋放錠

Forflow® Sustained Released Tablets 400mg

"*LOTUS*" (Pentoxifylline)

本藥須由醫師處方使用

GMP
G-5506
衛署藥製字第 040399 號

【組成】

持續釋放錠：每錠含Pentoxifylline.....400mg

【賦形劑】

Lactose Monohydrate, Hydroxypropyl Methylcellulose,Povidone K-30, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, Ethanol,Water Purified.

【臨床藥理】

Pentoxifylline可促進末稍血液循環，作用複雜且尚未完全明瞭。口服吸收良好。吸收後很快經肝臟代謝（First-pass effect）成多種不同代謝物。主要由尿中排泄。

【適應症】

末梢血管循環障礙。

【用法用量】

1.通常成人劑量，一天3次，每次100～400mg，伴著些液體整粒吞服與食物共服。若病人有出現胃腸或中樞神經的副作用時，則其劑量應減量，如果其副作用仍然持續，則停止服用。

2.雖然在治療2-4週後，即會出現療效，但仍須持續治療八週以上。

3.有低血壓，血壓不穩的患者或腎功能不良者，須調整個別劑量。

【禁忌】

禁用於下列患者:

對Pentoxifylline、其他甲基葉黃素製劑(methyl-xanthines)或Forflow®的任何賦形劑過敏者。

大量出血者(有使血量升高之危險)。

【特殊警告與注意事項】

出現過敏/類過敏性反應的徵兆時，應立即停止服用Pentoxifylline，並通知醫師。對下列患者必須特別小心監測:

1.嚴重心律不整患者，
2.心肌梗塞者，
3.低血壓患者，
4.腎功能缺損患者(肌酸酐廓清除速率低於30ml/min)，
5.嚴重肝功能不良患者，
6.有出血傾向之患者(參閱“禁忌”欄)，
7.同時以抗vitamin K藥品和Pentoxifylline治療的病人(參閱“交互作用”欄)
8.同時以抗糖尿病藥品和Pentoxifylline治療的病人(參閱“交互作用”欄)
9.同時以ciprofloxacin藥品和Pentoxifylline治療的病人(參閱“交互作用”欄)

【交互作用】

併用時應小心

可能會加強胰島素或口服抗糖尿病的降血糖作用，因此，應小心監視正在使用藥物治療糖尿病的患者。

同時以抗vitamin K藥品和Pentoxifylline治療的病人，有抗凝血活性增強的上市後副作用通報的個案曾被報告過，因此在開始使用Pentoxifylline或改變Pentoxifylline劑量時，應小心監視此類患者。

併用時應列入考量

Pentoxifylline可能會增強抗高血壓藥物及其它具降血壓作用之藥物的降血壓作用。對某些患者而言，合併投與Pentoxifylline及theophylline可能會使theophylline的體內含量升高，這可能會導致與theophylline相關之副作用的發生率提高或嚴重度增強。

合併投與Pentoxifylline及ciprofloxacin可能會使Pentoxifylline的血清濃度升高。因此，合併用藥可能會增加相關副作用。

【懷孕】

關於懷孕期間之使用，由於所獲得之經驗不足，因此，不應於懷孕期間使用Pentoxifylline。

【授乳】

微量的Pentoxifylline會移行進入乳汁中。由於所獲得之經驗不足，因此，在對授乳婦女投予Pentoxifylline之前，醫師必須小心評估可能發生的危險性與治療效益。

【副作用】

下列不良反應曾在臨床試驗或上市後不良反應通報中被報告過，這些不良反應的發生率未知。

依器官系統分類	不良反應
實驗室檢查	轉氨酶增高 血壓降低
心臟異常	心律不整、心跳過速、心絞痛
血液及淋巴系統異常	血小板減少症
神經系統異常	頭暈、頭痛、無菌性腦膜炎
胃腸系統異常	胃腸不適、胃部壓迫感、腹脹、噁心、嘔吐、腹瀉
皮膚與皮下組織異常	搔癢、皮膚發紅、及蕁麻疹
血管異常	潮紅(皮膚發紅發熱)、血腫(出血)
免疫系統異常	過敏性/類過敏性反應、血管神經性水腫、支氣管痙攣、循環衰竭(休克)
肝膽系統異常	肝臟膽汁鬱積
精神異常	焦慮、睡眠障礙

【過量】

過量的症狀及徵兆

Pentoxifylline急性過量初期可能有噁心、暈眩、心悸或血壓下降的症狀。而且，可能發生發燒、焦慮、潮紅、喪失意識、反射消失、強直陣攣性抽慉及咖啡滓狀嘔吐(腸胃道出血的跡象)等徵象。

過量之處置

Pentoxifylline並無任何已知的特定解毒劑。急性過量的治療與併發症的預防可能需要一般性及特定的密集監控與治療措施。

【貯存條件】

請置於25°C以下儲存。

【包裝】

6-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔裝

LOTUS
A new drug development company

藥　商：美時化學製藥股份有限公司
地　址：台北市大安區信義路三段149號15樓
製造廠：美時化學製藥股份有限公司南投廠
廠　址：南投縣南投市新興里成功一路30號

040602