"瑞士"

壓得平 錠 5 公絲(阿米諾樂)

Edepin Tablets 5mg "SWISS"(Amiloride)

衛署藥製字第 040428 號 G-5516

本品[illegible]用性的利尿劑，可預防排空鉀的[illegible]hiazide)引起的低血鉀症，其化學結構和其他類的利尿劑均不相關，本品亦適用於糖尿病合併高血壓患者，這類病人使用利尿劑很容易造成低血鉀，這和尿液糖份過多有關，尤其胰島素依賴型者(因血糖儲存於細胞內，須鉀離子進入細胞方可進行)。

「成份」: Each Tablet Contains:

Amiloride Hydrochloride 5.68mg

Eq. to anhydrous Amiloride Hydrochloride 5.00mg

「藥理作用」:

1.作用在腎小管遠端，降低鉀的漏失，本品非ADH(Aldosterone)的拮抗劑，具微弱的利尿和抗高血壓的活性。

2.藥物動力學:始效期:口服後 2 小時；尖峰效應:6~10 小時之間；血漿半衰期:6~9 小時；代謝:本品在體內不經肝臟代謝，而於 72 小時內由尿(約 50%)及糞(約 40%)排出。

「適應症」:

利尿、高血壓。

「用法用量」:

初劑量 5.0mg/天，常與其它利尿劑併用；若需要時，可增加至 10mg/天。嚴重持續性低血鉀者，最大推薦劑量:20mg/天。本藥須由醫師處方使用。

「注意事項」:

1. 下列患者慎用本品:糖尿病、腎受損、心肺疾患、孕婦、授乳婦、老年人。

2. 應定期監測血鉀濃度，特別在治療初期時，須注意高血鉀癥兆(虛弱、疲倦、心跳過慢、感覺異常)。

3. 副作用:高血鉀、頭疼、噁心、食慾不振。

4. 服用本品避免補充鉀和攝取富含鉀的食物(如:香蕉、橘子汁、棗子、胡蘿蔔、新鮮魚類)。

「包裝」:

2~1000 錠/塑膠罐裝、鋁箔盒裝。

Code No.:STEDTE12

瑞士藥廠股份有限公司

SWISS PHARMACEUTICAL CO. LTD.

台南縣永康市四維街 164 號