MIC100 1.2
衛署藥製字第040644號PIC/S GMP G-5582
衛部藥廠證字第(AP)0433067號

適用藥害救濟制度

"國嘉" 美諾四環素膠囊100毫克

Minocycline Capsules 100mg "KOJAR"

本品爲半合成的四環素，口服幾乎完全吸收。脂溶性而且有很長的半衰期(達24小時)，口服吸收不受食物或日常食品有所改變，惟一代謝成進一步代謝物的四環素。少發生光敏感之現象，但會產生CNS作用(輕微的頭痛、眩暈)所以駕駛或操作機器時須小心。

【成　　份】
Each Capsule Contains：
Minocycline (as Hydrochloride).....100mg(Potency)

【賦 形 劑】
Lactose、Magnesium Stearate、Talc
膠囊殼(Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Purified Water、Brilliant Blue FCF、Erythrosine、Titanium Dioxide、New Coccin、Tartrazine、Sunset Yellow FCF)

【適 應 症】
革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒所引起之感染症。

【用法用量】
初次投與量100~200mg(力價)，以後12小時投與100mg(增減)。小兒1日2~4mg(力價)/kg，12小時投與一次(增減)。參考量11~10歲60~120mg，9~8歲50~100mg，7~5歲40~80mg，4~3歲30~60mg，2~1.5歲20~40mg，3~2個月10~20mg(增減)。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】
1.使用本品時，若發現產生耐受性時，應以疾病治療上必要之最短時間為限。
2.一般的注意事項：本品會產生頭痛、眩暈現象，故從事駕駛或操作機器時須注意。

【禁忌症】
曾對本藥產生過敏病例患者應禁用。

【醫療提示】
以下患者需慎重投與：
1.有高度腎障礙的患者。
2.有肝障礙或食道障礙之患者。
3.對於孕婦、授乳婦之服用本劑其安全性未確立，故孕婦或可能懷孕的婦人，應避免投與。
4.對小孩投與，其安全性未予確定，故小孩應避免服用。

【副 作 用】
1.呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、不快感、口內異常感，喘鳴、便意、耳鳴等。
2.過敏症：發熱、發疹、浮腫(四肢、顏面)、全身性紅斑性狼瘡(SLE)樣症狀。
3.皮膚：皮膚粘膜眼症侯群(Stevens-Johnson症侯群)、剝脫性皮膚炎、光線過敏症等。
4.肝臟：黃疸、GOT、GPT上昇。
5.消化器：食慾不振、噁心、嘔吐、腹痛、下痢、口內炎、舌炎、肛門周圍炎等。
6.血液學：溶血性貧血、嗜伊紅血球增多、嗜中性白血球減少、血小板減少症、白血球減少、白血球增多等。
7.其他方面：增加BUN，牙齒永久性變色齒釉質發育不全、傷害骨的構造之鈣化、非敏感性生物體的過度生長(如念珠菌)。

【交互作用】
1.本品的口服吸收，受制酸劑、鐵或其他多價陽離子(如Calcium、Magnesium、Aluminum)和鹼(如Sodium Bicarbonate)的影響而破壞。
2.本品藉干擾腸內微生物合成維他命K而加強口服抗凝血劑作用。

【包　　裝】
4~1000粒瓶、鋁箔盒裝。

【儲　　存】
室溫避光保存(25℃)。

PIC/S GMP

國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3
臺中市大甲區日南里工十路2號
服務專線：(04)26816197