5*11



品名:晟德息咳寧糖漿
諮詢專線:(02)2655-8680

柑橘口味 〝晟德〞息咳寧糖漿Secorine Syrup〝Center〞 綜合感冒劑 衛署藥製字第040833號

【成分】:每毫升(ml)含有
有效成分及含量:dl-Methylephedrine Hydrochloride.....1.0 mg
Chlorpheniramine Maleate...0.1 mg
Glyceryl Guaiacolate.....5.0 mg
其他成分(賦形劑):Sodium Citrate, Citric Acid Anhydrous, Sodium Benzoate, Methylparaben, Sucrose, New Coccine, Sunset Yellow FCF, Orange Essence, Aspartame, Water Purified
【用途(適應症)】:
緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)
【使用上注意事項】:
1.有下列情形者,請勿使用:
(1)曾因本藥成分引起過敏的人。
(2)苯酮尿症的人,因本藥含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑。
2.有下列情形者,使用前請洽醫師診治: (1)6歲以下。
(2)有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
(3)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
(4)有呼吸疾病的人:如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難,及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
(5)有心臟病及65歲以上的人。
3.有下列情形者,使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生:
(1)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(2)正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
(3)服用鎮靜藥或安眠藥的人。
4.其他使用上注意事項:
(1)為防止兒童誤食請妥善保管。
(2)避免陽光直射。
(3)勿超過建議使用量。因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠,兒童可能會產生躁動。
(4)使用前須振搖均勻,並使用廠商所附量器量取藥量。
(5)不要服用本藥超過七日。
(6)可能引起嗜睡,勿駕車或操作危險性機械。
(7)不得與酒精性飲料併用。

【用法用量】:

年齡	每次用量
成人及12歲以上	20毫升,一日3次
9歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2(10毫升)
6歲以上未滿9歲	適用成人劑量之1/3(6.7毫升)
6歲以下	請洽醫師診治

【警語】:1.服用本藥後,若有發生以下副作用,請立即停止使用,並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生:

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

2.服用本藥後,若有發生以下症狀時,請立即停止使用,並接受醫師診治:
(1)若有任何不適情形產生。
(2)咳嗽持續達一星期以上,或高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
(3)症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
(4)喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
【包裝】:20~4000毫升塑膠瓶裝

【類別】:醫師藥師藥劑生指示藥品
【儲存】:請密封儲存於25℃以下,不須冰存。
晟德大藥廠(股)公司(新竹廠)
公司地址:臺北市南港區園區街3之2號7樓
製造廠址:新竹縣湖口鄉實踐路2號
諮詢專線:(02)2655-8680

品名:晟德息咳寧糖漿
用途(適應症):緩解感冒之各種症狀
(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)。
用法用量:
成人及12歲以上每次20毫升,一日3次
9歲以上未滿12歲適用成人劑量之1/2(每次10毫升)
6歲以上未滿9歲適用成人劑量之1/3 (每次6.7毫升)
6歲以下請洽醫師診治
劑型與特徵:糖漿;橘色橘子香
諮詢專線:(02)2655-8680