"永昌"

普雷錠

衛署藥製字第040906號G-5699
健保代碼A040906100
4公絲（甲基培尼皮質醇）

Prea Tablets 4 mg "Y.C" (Methylprednisolone)

【成　　分】：每錠中含有：

主成份：Methylprednisolone.....4mg

賦形劑：Lactose.Starch. Povidone K-30. Calcium C.M.C

Magnesium Stearate .

【適 應 症】：風濕性熱，風濕性關節炎及過敏性症狀。

【用法用量】：一日4－48mg，1－4回分次服用，可依症狀適宜增減，本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

禁　　忌：對本劑有過敏症既往歷史者。

慎重投與：感染症患者，糖尿病患者，骨質疏鬆症患者，腎不全患者，甲狀腺機能低下者，肝硬變患者，脂肪肝及脂肪栓塞患者，重症筋無力患者及高齡患者。

副 作 用：

感染症：誘發感染症，感染症增惡等現象。

內分泌：續發性副腎皮質機能不全，糖尿病，月經異常等

消化器：消化性潰瘍，胰臟炎，下痢，噁心嘔吐食慾不振，胃痛，腹部膨漲感。

精神神經系：精神變調，鬱症，不眠，頭痛，眩暈。

皮　　膚：痤瘡，多毛，脫毛，色素沉著，皮下溢血，紫斑，騷癢等。

其　　他：骨質疏鬆症（大腿骨，上腕骨無菌壞死），筋肉痛關節痛，脂質代謝異常（滿月樣顏，野牛肩，脂肪肝等）

相互作用：

1. 巴比妥酸誘導體，Phenytoin, Rifampicin 等併用則促進代謝作用，本劑作用減弱。
2. 水楊酸誘導體併用時，本劑減量使用，因血清中水楊酸濃度增加可能引起水楊酸中毒。
3. 抗凝血劑，口服糖尿病製劑併用作用減弱。
4. 利尿劑（保鉀性利尿劑除外）併外，有低鉀血症現象。

包　　裝：2－1000粒塑膠瓶裝。

CODE NO: UPT-4 "Y.C"

委託者：永昌藥品股份有限公司
台中市大甲區光明路140號3樓
TEL:(04)2 6 8 7 7 1 1 4～5
FAX:(04)2 6 8 7 2 4 4 2

製造廠：利達製藥股份有限公司
台中市大甲區中山路一段906號