cGMP 藥品　　衛署藥製字第 041009 號

"派頓" 風 友 寧　顆粒

Honjolin granule "Patron"

【主 成 分】:

每包中含(1000mg):

Salicylamide----------250mg

Acetaminophen----------150.0mg

Caffeine Anhydrous----------18.75mg

Chlorpheniramine Maleate----------1.875mg

【賦 形 劑】: Sucrose, Starch, Lactose, Newcoccine, Food Color Green No.3, Tartrazine.

【適 應 症】:

緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。

【用法用量】:

一日 3 次。飯後半小時內服用爲宜。18 歲以上，每次 1 公克(1 包)。

【類　　別】: 醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】:

1.為防止兒童誤食請妥善保管。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3.除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：

(1)孕婦及授乳婦不建議自行使用。

(2)服用本藥時不得併服其他藥品。

4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警　　語】:

1.服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。

2.除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(1)18 歲以下不建議自行使用。

(2)曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。

3.患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。

4.除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。

5.若咳嗽持續達一星期以上，或若有發燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。

6.吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。

7.不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。

8.不要服用本藥超過七日。

9.服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。

10.服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。

11.酒精警語:不得併服含酒精飲料,Salicylamide 可能造成胃出血。

12. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(一)本藥不得使用於 18 歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群(Reye's Syndrome)

(二)曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之患者，不得服用本藥。

(三)蠶豆症(6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency)患者，不宜服用本藥。

(四).懷孕第三期婦女不得使用。

13.本藥含抗組織胺類成分，應注意下列事項：

(一)服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要合併飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。

(二)除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。

14.本藥含咖啡因類成分，應注意下列事項：

(一)應限制再服用含咖啡因藥品、飲料(如：茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起神經緊張,興奮與失眠,且常會引起心搏過速。

(二)為避免造成依賴性及肝損害，不可長期使用。

(三)18 歲以下兒童及青少年不建議使用。

15、肝毒性：

(1)使用 acetaminophen(paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日 4000 毫克的 acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 acetaminophen 成分之藥品。

(2)病人應注意藥品的標示中是否含有 acetaminophen 或 paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過 4000 毫克的 acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

16、與酒精併用：慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險。

17、過量：

(1)服用過量 acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。

(2)本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。

(3)Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀，可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床證據可能要等到攝入後 48~72 小時才明顯可見。

18、過敏/過敏性反應：

上市後曾有發生與使用 acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療良之過敏反應的案例。如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。

19、嚴重皮膚反應：使用 acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿皰病(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏－強生症候群(Stevens Johnson Syndrome, SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis,TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

【儲　　存】: 25℃以下儲存。

【包　　裝】: 6-1000 包鋁箔袋盒裝(每包 1 公克)。

臺灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄市岡山區爲隨東路 50 號
TEL：(07)6216126