

安脈循利腸溶膜衣錠 100 公絲(阿斯匹林)

Nimape Enteric F.C. Tablets 100mg (Aspirin)

編號：E98

本品係阿斯匹林劑(Aspirin)上包覆腸衣，其主要目的是使阿斯匹林在較高 pH 之環境之十二指腸中溶解，避免在胃中之酸性環境下溶解，此舉乃是避免阿斯匹林劑對胃造成傷害。

經實驗證明本品可因具有減少血小板凝聚及抑制凝血酶原形成的作用而達到降低冠狀動脈栓塞及心絞痛病人發生危險或死亡的機率，在預防心臟血管病變之有關血栓栓塞併發症(如：靜脈栓塞、腦缺血症等)。

成分：

Each Enteric F.C. Tablet contains :

Aspirin.....100mg

作用：由於本品能有效的抑制血小板凝聚，故被認定在治療心血管疾病上有助益。特別是動脈之心血管疾患，由於本品可使 Cyclooxygenase 不活化，因而抑制 PG₂ 之合成。因此具有抑制血小板凝聚及使血管擴大之功效。

藥力學：本品因為是腸衣錠，故主要在小腸前端吸收。在體內它可迅速被水解成水楊酸，分佈於全身的各組織或體液中，而僅有少於 1% 之本品以游離或共軌結合形式排泄於尿中，而其排泄速率與血中濃度有關。

適應症：

男性短暫性缺血性發作，預防心肌梗塞，預防心栓性栓塞症。

用法、用量：

成人：每天三次，每次一錠。本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1. 注意本品一定要放在小孩拿不到之處。
2. 對於氣喘或腎功能不全病人注意小心給藥。

3. 孕婦及經痛婦女不建議使用本品。
4. 對長期高劑量使用本品病人須小心給藥。
5. 當本品與抗凝血劑併用時小心給藥。

禁忌：

1. 胃及十二指腸潰瘍病人禁用本品。
2. 對本品有過敏之病患，禁用本品。
3. 患有出血症病人禁用本品。
4. 有出血傾向病人禁用本品。
5. 懷孕第 3 期婦女禁用本品。

警語：

1. 不得併服含酒精飲料，因可能造成胃出血。
2. 本藥不得使用於 12 歲以下兒童，亦不得使用於 18 歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病-雷氏症候群(Reye's Syndrome)有相關性。
3. 豐豆症 (6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency) 患者，不宜服用本藥。

貯存：請貯存於 30°C 以下乾燥、陰涼之處所。

包裝：6-1000 錠鋁箔盒、塑膠瓶裝。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL : (02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號

(B)