【服　　用】：本劑應於口內咬碎後和水吞服，成人一天服三次，每次一或二片，於飯後服用，如於平時胃痛發作之時可加服一或二片，兒童八歲以上每次服用一片，八歲～四歲每次服半片。
指示用藥。

【注意事項】：(1)應嚴守用法、用量。
(2)不得連續使用一週以上。
(3)服藥期間不可喝酒。
(4)如遇有下列情形應即請教醫師：
①經數次服藥後，病況未見好轉時。
②便秘時。
③胃潰瘍或十二指腸潰瘍之患者。
④孕婦或懷孕徵候之婦人。
⑤使用於兒童時。
(5)須置於小孩接觸不到之處。
(6)避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
(7)除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
(8)勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
(9)液劑使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
(10)禁忌：腎不全導致鎂離子再吸收，可能引起中樞神經系統抑制和其他高鎂血症之症狀。
(11)相互作用：本品含有鋁和鎂離子，會降低四環素系列抗生素之血中濃度。
(12)其他 Aluminum Hydroxide 會與 Phosphate 反應產生不溶性之 Aluminum Phosphate，在病人有低磷現象時引起磷的缺乏，這種現象可服用牛奶或補充磷來克服。

【包　　裝】：6[illegible]0 粒鋁箔盒裝、瓶裝。

GMP

國嘉製藥工業股份有限公司二廠
KOJAR PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD. Second Factory
台灣省台中縣大甲鎮幼獅工業區工二路 33 號
電話：(04)681-5051~3