




非固醇類、鎮痛、消炎劑

“國嘉” 剛炎膠囊 200毫克(福納密酸)

Kanyen Capsules 200mg "KOJAR" (Flufenamic Acid)



【成分】每一膠囊含：

Flufenamic Acid.....200mg

【賦形劑】

Lactose Powder、Magnesium Stearate、Povidone、Cellulose Microcrystalline、Cyclodextrin、Beta、Croscarmellose Sodium、Talc、Sodium Lauryl Sulfate
膠囊殼(Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Titanium Dioxide、Tartrazine、Sunset Yellow FCF、Indigo Carmine、Purified Water)

【適應症】

關節炎、風濕、脊椎炎、皮膚炎、鼻炎、炎症性疾患。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用。

常人每天600mg，即每次一膠囊每天三次。

【注意事項】

1. 使用消炎鎮痛劑治療，乃為對症療法而非原因療法，應注意。
2. 使用於治療慢性疾病(慢性風濕性、關節炎、變形性關節炎)時應考慮下列事項：
 - a. 長期投與時，須定期作臨床檢查(尿檢查、血液檢查、肝機能檢查)等遇有異常現象發生時，則採取減量或停藥等適切的處置。
 - b. 考慮採用非藥物性療法。
3. 仔細觀察患者之狀況，注意是否有副作用發生。
4. 本藥可能會使感染症不顯性化，因此用於治療感染所引起之炎症時必須併用適當之抗菌劑，並仔細觀察慎重投與。
5. 儘量避免與其他消炎鎮痛劑併用。
6. 對高齡及小兒患者，須特別注意是否有副作用發生，並以最低之有效劑量慎重投與。

【禁忌】

1. 消化性潰瘍患者。
2. 重症之血液異常患者。
3. 重症之肝障礙患者。
4. 重症之腎障礙患者。
5. 對本劑有過敏之患者。
6. 患有Aspirin氣喘或曾有該病歷之患者。

【慎重投與】

1. 血液異常及有既往歷之患者。
2. 有過敏症既往歷之患者。
3. 支氣管氣喘之患者。

【副作用】

1. 血液: 溶血性貧血、白血球減少、紫斑病等血液障礙症狀，注意觀察並作血液檢查，有異常現象發生時應停止投與。
2. 過敏症: 有發疹等過敏症狀出現時，應停止投與。
3. 肝臟: 偶有S-GOT, S-GPT、鹼磷酸酯酶上昇等肝機能檢查值異常現象。
4. 消化器: 間有食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛、腹痛及下痢等症狀出現。
5. 精神神經系: 間有眩暈，偶有頭痛等症狀。
6. 其他: 間有浮腫現象。

【妊婦及授乳婦之投與】

投與之有關安全性未確立。

【包裝】

6~1000粒塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【儲存】

室溫避光保存(25℃)。

PIC/S GMP



國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3

臺中市大甲區日南里工十路2號
服務專線：(04)26816197