"瑞 安" 利痰 錠 8毫克

（鹽酸溴克辛）

"Purzer" Return Tablet 8 mg

(Bromhexine Hydrochloride)

瑞安大藥廠股份有限公司　PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

PIC/S GMP　衛署藥製字第 041274 號　GMP 優良藥品 G-5792 號
醫師藥師藥劑生指示藥品

【成　分】

每錠含
Bromhexine Hydrochloride…………8 mg
賦形劑: Microcrystalline Cellulose, Lactose Monohydrate, Magnesium Stearate

【適 應 症】

祛痰及減少呼吸道黏膜分泌物的黏稠性。

【用法用量】

一天 3 次。成人每次 1 錠，12 歲以上適用成人劑量；6 歲以上未滿 12 歲，每次 1/2 錠；3 歲以上未滿 6 歲，每次 1/4 錠；3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。

【副作用】

1. **輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。**
2. **若有皮疹等過敏現象應停藥。**

【注意事項】

1. **為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。**
2. **避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。**
3. **除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。**
4. **勿超過建議劑量。**
5. **服藥後若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。**
6. **本藥不得與含酒精飲料併服。**
7. **根據動物實驗報告，長期連續大量使用，有血清 Transaminase 值上升的情形；服用本藥後由於喀痰量一時增加，對神經質患者常會有不安的現象。**

【警語】

1. **吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患(包括如慢性氣管炎、肺氣腫)所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。**
2. **有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。**
3. **除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：**
    - **(1) 3 歲以下，請洽醫師診治。**
    - **(2) 曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。**

【儲存條件】

本品請貯存於 15~30℃以下處所。

【包裝種類】

6-1000 錠塑膠瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

瑞安大藥廠股份有限公司
地　　址：台北市松山區光復南路 1 號 12 樓之 2
製 造 廠：瑞安大藥廠股份有限公司觀音廠
廠　　址：桃園市觀音區草漯里大同一路 26 號
服務電話：(02)2766-0887