衛署藥製字第041364號

"黃氏"

鎮咳祛痰劑

嗽可糖漿

SOUC SYRUP "H.S."

咳嗽常為感冒，支氣管炎等疾病所引起或所遺下之症狀，一般均帶有濃稠之痰，使患者增加痛苦與困擾，本劑即為針對上述症狀配合有效成份，以達鎮咳又祛痰之治療劑。本劑中之Codeine Phosphate能鎮靜麻痺咳嗽中樞，以抑制咳嗽發作，Potassium Guaiacol Sulfonate能增加氣管內分泌物之排泄，而有顯著之祛痰作用，尚有其他有效成分之配合，使本劑成為具有鎮咳並有祛痰作用之綜合性有效製劑。

【成　　分】：Each ml contains：

Codeine Phosphate	0.48mg
DL-Methylephedrine Hydrochloride	1mg
Chlorpheniramine Maleate	0.2mg
Potassium Guaiacol Sulfonate	3mg
Platycodon Fluid Extract	0.06ml

【賦形劑】：Citric Acid、Menthol、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Sucrose、Sodium Chloride、Caramel、Sorbitol、Alcohol、Strawberry Essence、Champagne Essence、Orange Essence、Cherry Essence、Purified Water。

【適 應 症】

鎮咳、祛痰（支氣管炎、咽喉炎、感冒所引起之咳嗽、祛痰）。

【用法用量】

通常一日量為2～3歲2ml，4～6歲3ml，7～11歲4ml，12～14歲5ml，15歲以上成人10ml。一日服用三次，醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

Codeine Phosphate(1)禁忌(一)有重篤抑制呼吸之患者（增強呼吸抑制）(二)支氣管喘息發作中之患者（妨礙氣道分泌）(三)有重篤肝障礙之患者（可能昏睡）(四)於慢性肺疾患續發的心不全患者(五)於痙攣狀態（癲癇重積症、破傷風、Strychnine中毒）之患者(六)對鴉片ALKALOID有過敏症之患者。(2)慎重投與(一)有心肝腎呼吸機能障礙之患者(二)於腦中急有器質的障礙之患者(三)於休克狀態之患者(四)有甲狀腺機能低下症（粘液水腫等）之患者(五)有副腎皮質機能低下症之患者(六)有機物依存之既往歷的患者(七)新生兒、乳兒、高齡者、衰弱者。(3)副作用(一)依存性：依反覆使用發生藥物依存，十分觀察後慎重投與之。又於連用中急激減少投與量或中止投與時會出現打呵欠、打噴嚏、流淚、發汗、噁心、嘔吐、下痢、腹痛、散瞳、頭痛、不眠、不安、振戰、全身筋肉關節痛、呼吸促迫等的禁斷症狀(二)呼吸循環器系：有時可能出現呼吸抑制、不整脈、血壓變動等等症狀。由於本劑引起的呼吸抑制、麻藥拮抗劑(Levallorphan)可拮抗。(三)精神神經系：有時可能出現睡意、暈眩、視調節障礙、發汗等症狀(四)消化系：有時出現噁心、嘔吐、便秘等症狀(五)過敏症：有時出現發疹、搔癢感等的過敏症狀。若出現此等症狀即中止投藥。(六)其他：有時出現排尿障礙、顏面紅潮。(4)妊婦之投與(一)因此在此類化合物（嗎啡）的動物實驗有催畸形作用的報告，對妊婦或可能有妊婦的婦人，於治療上判斷有益性大於危險性時始可投與。(二)於分娩前投藥時，出生的新生兒有時出現禁斷症狀（多動、神經過敏、不眠、振顫等），(5)相互作用：與下記醫藥品併用或因飲酒其作用因而可能增強，不要投與，若不得不投與時須慎重投與：Phenodiazine誘導體，Barbital酸誘導體等的中樞神經抑制劑、三環系統抗鬱劑B遮斷劑、Cumarin系抗凝血劑。(6)其他注意：因可能引起睡意、眩暈，對投與本劑中的患者不可給予伴有危險的機械操作、汽車駕駛等工作。DL-Methylephedrine HCl (1)一般注意：(一)若正確依照用法用量服用，無效果時中止投與，對小兒投與須正確指導使用法，細心觀察經過。(二)若繼續過量使用可能引起心停止，尤其打針有此傾向，故須注意不得過度使用。(2)慎重投與：(一)甲狀腺機能亢進症(二)高血壓(三)糖尿病(四)心疾患。(3)副作用：有時出現心悸亢進，顏面蒼白等症狀(一)精神、神經系：（內服）有時出現頭痛、熱感、稀有出現不眠、眩暈、神經過敏、疲勞等症狀。(二)胃腸：（內服）有時出現噁心、食慾不振、腹部膨滿感等症狀。(三)過敏症：若發現發疹等過敏症狀時即停止投藥。(四)其他（內服）有時發生口渴。(4)相互作用(一)與下記藥劑併用時其作用恐會增強，故須減量等慎重投與：Monoamine氧化酵素阻礙劑、甲狀腺製劑(Thyroxine Liothyronine等)(二)與Epinephrine及Isoprothenol等併用有時發生心臟停止，故須避免併用。

【警　　語】：

長期使用易致成癮。

(1)早產兒、1歲以下嬰兒及1～2歲幼兒，不建議使用。(2)2～12歲兒童，依年齡減量使用。(3)肝、腎功能不全者，應小心謹慎減量使用。

【包　　裝】：

10～90ml玻璃瓶裝，3785ml塑膠瓶裝。

內附有20ml量杯一只。

PIC/S GMP廠廠

製造廠：黃氏製藥股份有限公司

雲林縣斗南鎮大同路444號11號

經銷商：船林藥品有限公司

高雄市前鎮區二聖二路5號

S-06