



永信皆樂懸液能發揮顯著之制酸抗脹氣效果，有效緩解胃酸過多、脹氣等不適症狀。

**【成 分】** 每mL中含：

Aluminum Hydroxide Dried Gel.....	105mg
(eq. to Aluminum Hydroxide 80mg)	
Magnesium Hydroxide.....	80mg
Simethicone Emulsion 30%.....	26.67mg
(eq. to Simethicone 8mg)	

註：本藥每mL之酸中和能力大於4.4mEq，含鎂量為2.76mEq

**【賦形劑】**

Sodium Methyl Paraben、Sodium Propyl Paraben、Glycerin、Sorbitol Solution 70%、Sodium Saccharin、Xanthan Gum、Colloidal Silicon Dioxide、Alcohol、Peppermint Oil 76/3245、Purified Water。

**【作用】**

1. 本藥中含制酸活性成分—氯氧化鋁及氯氧化鎂。
2. 本藥含消泡劑，使用於解除脹氣及緩解氣脹相關症狀。

**【適應症】**

緩解胃部不適或燒灼感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多及解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

**【用法用量】**

一天3至4次，或需要時服用。  
成人每次4mL，12歲以上適用成人劑量；  
6歲以上未滿12歲，每次2mL；  
3歲以上未滿6歲，每次1mL；  
3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。  
醫師藥師藥劑生指示藥品。

**【注意事項】**

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 使用前須振搖均勻，並使用包裝內附量器（本包裝內附30mL量杯）量取藥量。

**【警語】**

- 一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
  - (一)未滿3個月之嬰兒不得服用。
  - (二)一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
  - (三)本藥不得併用其他藥品。
- 二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 三、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- 四、本藥含鋁之制酸成分可能會引起便祕，偶有噁心、嘔吐。
- 五、腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。
- 六、本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。
- 七、本藥含碳酸鹽（或碳酸氫鹽）之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。

**【副作用】**

偶有引起腹瀉、便祕、噁心及嘔吐等現象。

**【保存上之注意】**

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

**【包裝】**

24~4,000毫升塑膠瓶裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2149591