

綜合感冒劑
傷得風友液
Suntephenyu Solution

(桂皮口味)

【成 分】每毫升含：

有效成分及含量：	Acetaminophen	15 mg
	Chlorpheniramine Maleate	0.12 mg
	Carbetapentane Citrate	0.48 mg
	DL-Methylephedrine Hydrochloride	0.48 mg
	Potassium Guaiacol Sulfonate	3 mg
	Caffeine Anhydrous	1.8 mg

其他成分(賦形劑)：Methylparaben, Butylparaben, Potassium Sorbate, Caramel, Alcohol, Chocolate (Flavour), Prune Flavour, Cinnamic Aldehyde, Sucrose, Sodium Citrate, Glycyrrhizate Trisodium, Purified Water.

【用途(適應症)】緩解感冒之各種症狀（咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰）。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一) 12歲以下。

(二) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。

(三) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。

(四) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。

(五) 有心臟病及65歲以上的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。

(三) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

(四) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項：

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量。

(四) 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器(瓶身刻度)量取藥量。

(五) 不要服用本藥超過七日。

(六) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。

(七) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol) 有急性肝衰竭的風險。

(八) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

(九) 不得與酒精性飲料併用。

(十) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

成人及 12 歲以上

一日 4 次，每次 8 ml。

【警 語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有任何不適情況產生。

(二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。

(三) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。

(四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

(五) 服用過量[每日超過Acetaminophen 4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

(六) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包 裝】8 ~ 4000 毫升玻璃瓶裝。

衛署藥製字第 041469 號

【類 別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】25°C 以下避光儲存。