衛署藥製字第 041639 號
GMP G-5999

"壽元"美賽新靜脈注射液 80 公絲/公撮

Pexacin I.V. Injection 80 ㎎/ml "S.Y." (Pefloxacin)

【成　　分】

每毫升中含有：

Pefloxacin(Methanesulfonate) ……..……...…80 mg

賦形劑：Sodium Ascorbate,　Water for Injection。

【適 應 症】

成人由革蘭氏陰性菌及葡萄球菌引起的嚴重感染症。

【用法】

經靜脈輸注時，必須緩慢進行(約一小時)先將本瓶一安瓿 400 公絲，稀釋在 250 公撮的等張葡萄液中，每天兩次(早晚各一次)。本藥限由醫師使用。

【用量】

(1)肝功能正常的成人：平均每天使用 800 公絲，初次劑量可給 800 公絲，以便很快達到有效血中濃度。

(2)肝功能不良的成人：若病患肝功能嚴重不良或肝血流減低者，每天的劑量於兩次之投與間隔必須延長且調整之。通常建議 Pexacin 注射液經靜脈輸注時，以每小時每公斤體重使用 8 公絲之速度施行之並遵照下列指示：

①沒有腹水或黃膽之病患每天使用兩次。

②有黃膽之病患，每天使用一次。

③有腹水的病患，每 36 小時使用一次。

④同時有腹水及黃膽之病患，每二天使用一次。

(3)腎功能不良之病患不需減少劑量。

【副作用】

消化不良：胃痛、噁心、嘔吐、過敏性皮膚反應及感光過敏反應、肌肉或關節痛，高劑量下(每天 1600 mg)會引起血小板減少，神經不適症包括頭痛、失眠。

【警語】

(1)因爲鏈球菌性肺炎及其它鏈球菌對 Pexacin 並非一致有效，因此對已被檢驗確認之細菌引起之呼吸道感染症，本品不應被處方爲第一線治療劑。

(2)由於有感光過敏反應之危險，因此在治療期間及之後的幾天內應避免曝露在日光及紫外線下。

(3)肌腱炎有時出現在 Achiile tendon 導致破裂，一旦出現此症狀請立刻送醫就疹。

【配合禁忌】

(1)對 Quinolone 類藥品過敏者。(2)孕婦。(3)授乳婦。

(4)Glucose-6-phosphate Dehydrogenase 缺乏者。

(5)15 歲以下兒童。

【注意事項】

對嚴重的肝功能不良病患，劑量必須調整。

【其他】

Pexacin 不會干擾尿中葡萄糖之檢驗值。

【包裝】

每支 5ml Ampoule 裝。

壽元化學工業股份有限公司

嘉義市新民路 128 號