V1.

"中美" 舒筋樂® 治酸痛外用液1%(吲哚美洒辛)

SUCHILA SOLUTION 1% "C.M." (Indomethacin)

衛署藥製字第041791號 G.M.P. G-6082

"中美"舒筋樂治酸痛外用液，是一種外用消炎鎮痛液，具有鎮痛、消炎及抗腫作用，塗抹於患部後，能經皮膚吸收，直接滲透至肌肉、關節等皮下組織內，發揮藥效，以緩解疼痛、腫脹、壓痛等炎症症狀。

【特點】

1.含非類固醇消炎止痛成分Indomethacin，及多種相乘效果配方，對於因運動造成之肌肉痠痛、肩膀、腰、背痠痛、關節痛、扭挫傷、跌打撲傷、神經痛等各類疼痛。2.特別添加Menthol及Methyl Salicylate，除增加涼感外，更具止痛效果。3.而Methyl Salicylate亦可促進局部血液循環，外用或局部塗擦可產生消炎和鎮痛作用，緩解皮膚、肌肉、神經及關節之腫脹疼痛。4.解除紅腫熱痛所帶來的不適感。5.不含Isopropyl Alcohol，不會刺激皮膚。6.隨身攜帶，使用便利。7.外用液劑，作用於局部疼痛之患部。

【成分】有效成分及含量：(Each ml Contains)

Indomethacin ····· 10mg

其他成分(賦形劑)：Menthol、Camphor、Butylparaben、Methyl Salicylate、Tween 80、Diethylene Glycol Monoethyl Ether (Transcutol)、Alcohol

【用途(適應症)】暫時性緩解局部疼痛。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。(二) 2歲以下兒童。(三)曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(一) 深部皮膚組織感染。三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：(一) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。 四、其他使用上注意事項：(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。(二) 避免陽光直射。(三) 勿超過建議使用量或使用次數。(四) 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。(五) 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。(六)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。(七) 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。(八) 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。(九) 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。(十) 請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。(十一) 本藥不可連續使用超過14天。(十二) 勿接近火源。(十三)不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛，使用前請諮詢醫師或藥師。(十四)避免觸碰衣物、塑膠品、木材、金屬。

【用法用量】

依症狀一日數回適量噴於患部。

【警語】

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	紅斑、搔癢、刺痛感。灼熱感、局部發紅、過敏性皮膚炎
其他	水楊酸效應(耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有上述外之其他不適情況產生。(二)自覺狀況沒有改善或更惡化。

(三)本藥可能引起白血球減少症、血小板減少症、顆粒性白血球缺乏症、胃腸出血及尿血症，如患者用藥後發生視覺問題應加注意。

【包裝】4000毫升以下鋁罐、塑膠瓶裝

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存條件】25℃以下避光儲存

委託者：

興中美生技有限公司
Sino Advance Biotech Co., Ltd.
台北市內湖區基湖路35巷6號5F 電話:02-87513383

製造廠：

PIC/S GMP藥廠
中美兄弟製藥股份有限公司
彰化市彰鹿路106號 諮詢專線:04-7524166
http://www.chungmei.com.tw