

“信東”利脈膠囊 10 毫克

Limy Capsules 10mg

(Phenoxybenzamine Hydrochloride)

【成分】

主成分：Each Capsule Contains：

Phenoxybenzamine Hydrochloride..... 10mg

賦形劑：Lactose Super-Tab、Magnesium Stearate、Capsule Shell (含 Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Erythrosine、Titanium Dioxide)。

【臨床藥理】

Phenoxybenzamine 是一個強力的 α -受體阻斷劑。因其與 α -受體具有非可逆性的共價鍵結作用，使其具有很長的作用時間，通常單次高劑量的 Phenoxybenzamine 可阻斷 α -受體達 3~4 天或更久。它會增加皮膚、粘膜、下腹臟器的血流，可降低仰臥及站立時的血壓。它對副交感神經沒有作用。Phenoxybenzamine 於胃腸道中不完全吸收，靜脈注射後約 1 小時可達其最大療效。然而，口服投與後其作用開始時間為漸進式且超過數小時，並持續達 3~4 天之久。其血中半衰期約為 24 小時。於肝中代謝，於尿中和膽汁中排泄，但有少數因共價鍵結的原因仍停留於體內持續作用達數日。Phenoxybenzamine 通常用以控制親鉻細胞瘤於手術前期間及一些不適手術之腫瘤病人之高血壓，可併用其他 β -受體阻斷劑用以控制其心搏過速之副作用，但必須在 α -受體阻斷劑完全抑制因親鉻細胞瘤所引起之高血壓前投藥。通常每日口服 10mg，視病人的反應可酌量增加劑量至每天每公斤 1~2mg 分兩次服用。對其他型的高血壓治療中，Phenoxybenzamine 亦常作為輔助性治療劑，亦常用於因神經性膀胱及攝護腺肥大或因周邊血管痙攣障礙引起之尿滯留之輔助治療劑。

【適應症】

周邊循環障礙、雷諾氏症、凍瘡、手足發紺、慢性肢端潰瘍、糖尿病性壞疽。

【用法·用量】

一般劑量為每天二次，每次 10mg。而對於神經性膀胱或攝護腺腫大造成之尿滯留，亦是每天二次，每次 10mg。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌及注意事項】

對於鬱血性心不全，冠狀動脈或腦血管循環障礙及腎功能不全的病人應小心使用。

Phenoxybenzamine 會加重呼吸道感染的症狀，併服其他藥物時，如 Adrenaline，因同時刺激 α 及 β 受體而增加 Phenoxybenzamine 的心搏過速及低血壓之副作用。

【副作用】

自主神經系統：姿態性低血壓，心搏過速，抑制射精，鼻充血及縮瞳。

其他：胃腸道刺激，嗜睡，疲勞。

【包裝】

4~1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 041816 號 G-5512

委託者：信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路 22 號

製造廠：榮民製藥股份有限公司
桃園市中壢區中山東路三段 447 號

40419140 ②