ECS-003
衛署藥製字第041827號

YSP

冒福®止咳 液
Excold Cough Solution

我們的上呼吸道每日均暴露在一個極度污染的環境中，其充斥著許多致病微生物，如濾過性病毒及細菌等，雖然人體具有相對的免疫力可用來抵抗這些病原體，但在一些特定的情況下，如體力耗弱或強毒性病原入侵下則可能會使人體正常防禦機轉爲之瓦解。而感冒或流行性感冒便是最常見且影響最廣泛的病毒傳染病，其所導致的咳嗽、喀痰、打噴涕、流鼻水及鼻塞等現象更常會造成患者極度的痛苦與困擾。本藥含有多重複合性藥效活性成分，在醫藥專業人員的指示下服用可有效緩解感冒期間所帶來的諸多不適現象。

【作　　用】

1. 本藥含咳嗽抑制劑－Dextromethorphan Hydrobromide，其可作用於延髓之咳嗽中樞，而降低咳嗽的嚴重度及次數，且在推薦劑量下，並無藥癮或鎮靜的現象發生。
2. dl-Methylephedrine Hydrochloride爲－支氣管擴張劑，可與Dextromethorphan Hydrobromide協同發揮優異之鎮咳效能。
3. Guaiphenesin爲－祛痰劑，其可刺激排痰反射而增加排痰量，降低濃痰黏稠度及改善感冒期間所引起之呼吸道刺激現象。
4. 本藥亦含抗組織胺成分d-Chlorpheniramine maleate，可降低呼吸道粘液之分泌量並阻斷過敏性反應之發生，而舒解流鼻水及喉頭不適症狀。
5. 本藥添加Caffeine，可緩解患者因感冒或服藥所引起之全身倦怠及四肢無力感。

【成　　分】

有效成分及含量：每mL中含**Dextromethorphan Hydrobromide**……**0.75mg**
dl-Methylephedrine Hydrochloride……**0.5mg**
Guaiphenesin……**10mg**
d-Chlorpheniramine maleate……**0.05mg**
Caffeine……**3.75mg**

其他成分（賦形劑）：Methylparaben、Propylene Glycol、Aspartame、Glycerine、Sucrose、Sorbitol Solution (70%)、Sunset Yellow FCF、Propylparaben、Water Purified。

【用途（適應症）】

感冒諸症狀（咳嗽、喀痰、流鼻水及打噴嚏等）之緩解。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：
1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。
3. 苯酮尿症(Phenylketonuria)患者。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1. 12歲以下。
2. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
3. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。
4. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
5. 有心臟病及65歲以上的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
3. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項：
1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量。
4. 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
5. 不要服用本藥超過七日。
6. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
7. 不得與酒精性飲料併用。
8. 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

一天3～4次，於飯後服用。

年齡	劑量
成人及15歲以上	每次20mL
12歲以上未滿15歲	每次13mL
12歲以下	請洽醫師診治

2149737

【警　　語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治
1. 若有任何不適情況產生。
2. 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
3. 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
4. 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

【包　　裝】

20～4000公撮塑膠瓶裝。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【類　　別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【給感冒患者的建議】
1. 多休息、多調養及注意營養補給以提高身體卻病能力。
2. 保持溫暖、增加室內溫度將有助於緩解部份症狀。
3. 多飲水以補充因感冒症狀所引起之水份流失。
4. 避免服用含辛辣或刺激性成分〔如咖啡因、酒精等〕之食物或飲料。
5. 適當的服用感冒藥雖能提供症狀的部份舒解，但若症狀仍然持續7天以上，就必須找醫師診斷是否患有其他併發性疾病。

YUNGSHIN®
永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電　　話：（04）26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2149737