

“信東”**發馬** 膜衣錠40公絲(啡莫替定)
Famo F.C. Tablet 40mg “S.T.” (Famotidine)

“信東”發馬膜衣錠為一新型之組織胺H₂接受體拮抗劑，不僅可以競爭性抑制組織胺作用於胃壁組織胺接受體所引起的基礎及夜間胃酸分泌，也可以抑制食物或五胃泌素(Pentagastrin)刺激所引起的胃酸分泌。本品之安全範圍大，不具有抗男性荷爾蒙作用及藥物代謝酵素之阻礙作用為其特點。
臨牀上，1日40mg即對胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合術後潰瘍、上部消化管出血、逆流性食道炎以及Zollinger-Ellison症候群有優異療效。本品實為胃、十二指腸潰瘍或出血之極佳治療劑。

【成分】

主成分：每膜衣錠中含Famotidine.....40mg
賦形劑：Lactose Monohydrate、Corn Starch、Hydroxypropyl Cellulose L、Calcium Stearate、Hydroxypropyl Methylcellulose、Opaspray White K-1-7000、Carnauba Wax。

【作用特性】

1. 本品為強力長效之組織胺H₂接受體拮抗劑，對胃酸及Pepsin分泌之抑制作用，如下：一般健康正常人或消化性潰瘍患者，基礎以及投與各種刺激劑時之2小時胃酸及Pepsin分泌量，經口服投與20mg，則各有71.6~99.6%、29.5~96.9%之抑制。

	胃酸分泌抑制率 (%)	Pepsin分泌抑制率 (%)
基礎分泌	98.0	71.0
Tetragastrin (40ug/kg筋注) 刺激分泌	94.7	75.1
Betazole (1mg/kg筋注) 刺激分泌	99.6	96.9
Insulin (0.2ug/kg靜注) 刺激分泌	71.6	29.5
食物刺激分泌	98.9	-

2. 本品對男性荷爾蒙及藥物代謝酵素皆沒有阻礙作用。
3. 安全性極大，且重覆使用後亦無積蓄性。
4. 不會影響胃排空時間及胰臟之外分泌功能。
5. 本品對胃酸之基礎分泌，各種刺激分泌、夜間分泌皆有抑制作用。
6. 本品對十二指腸患者胃液中之粘液物質濃度沒有影響。

【適應症】

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎及Zollinger-Ellison症候群、吻合術後潰瘍、上部消化道出血（消化性潰瘍、急性緊張性潰瘍、出血性胃炎而引起的）。

【用法・用量】

通常成人每次20mg，1日2次(早餐後及晚餐後或睡覺前)經口投與。又依年齡症狀適宜增減之。
但上部消化道出血時，通常以注射劑開始治療，待能口服後，始改成經口投與。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

一、一般注意事項：

治療期間應仔細觀察，依病狀輕重使用治療所需之最少劑量。如果沒有效果，請改用其他療法。

二、下列患者，須慎重投與：

- 1.有藥物過敏症既往歷之患者。
- 2.腎不全或肝障礙之患者。

三、副作用：

- 1.過敏症：偶有發疹、皮疹、蕁麻疹（紅斑）等症狀。當這些症狀出現時，請中止投與。
- 2.血液：偶有白血球減少的現象。
- 3.消化系統：偶有便秘、下痢、軟便、口渴、噁心、嘔吐等，腹部膨脹感、食慾不振等則極罕有。
- 4.循環系統：少有脈搏數增加、血壓上升、耳鳴、顏面潮紅等。
- 5.肝臟：偶有S-GOT，S-GPT上升等肝機能異常現象。
- 6.精神神經系：偶有全身倦怠、無氣力感、極罕有頭重感、頭痛等。
- 7.其他：少有月經不順、顏面浮腫等。

四、對於懷孕中投與之安全性尚未建立，因此孕婦或可能懷孕的婦女，最好不要投與。又本藥會移行至母乳之中，因此若投與授乳中之婦女，應注意不要授乳。

五、小兒使用的安全性尚未建立。

六、本劑會遮蔽胃癌引起的症狀，因此應確認病症為非惡性後始行投與。

【包裝】

2~1,000錠塑膠瓶裝，鋁箔盒裝。

【貯存】

放置於15~30°C避光乾燥處。

衛署藥製字第041882號G-6134



信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路22號

54060350⑤