

仿單標籤粘貼表

產品名稱	「內外」優舒軟膏	申請廠商	內外化學工業股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署導製字第041892號	號	

濕疹、皮膚炎治療劑

衛署藥製字第041892號
GMP:G-6141

「內外」

優舒軟膏

U-Sol Ointment "N.W."

【成 分】：每公克含

Crotamiton.....100mg
Hydrocortisone.....2.5mg

【性 狀】：

Crotamiton對各種形式的痛癢症都具療效。止癢效果迅速，且可持續6小時之久。由於減輕痛癢，可防止抓傷皮膚，因此減少了二次感染的危險性。

Crotamiton同時為一種獨特的殺蟲劑，此外，更具有抑制鏈球菌及葡萄球菌生長的作用；因此特別適合用以治療疥瘡，包括二次性體性皮膚感染。Crotamiton易於滲透入皮膚而不留下堅硬油膩的沈澱物於皮膚表面。Hydrocortisone的抗發炎、抗過敏、抗滲出性及抗搔癢作用使Crotamiton的治療效果更趨良好。這兩種成份的複合製劑特別適合於治療濕疹及痛癢。

【適 應 痘】：

疥瘡、急慢性濕疹、脂漏性濕疹、接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、皮膚搔癢症、神經性皮膚炎、蕁麻疹。

【用法用量】：

將薄層軟膏擦拭於患處，一天1至數次，因為軟膏能很快而完全地被皮膚吸收，所以通常不需要包紮。

★ 醫師藥師藥劑生指示藥品

【注意事項】：

1. 治療發炎傷口而造成感染時，應給予適當的抗生素或抗真菌劑治療，任何感染的蔓延需停止局部類固醇的治療。
2. 本品中之 Hydrocortisone 屬於類固醇，故大劑量、長期、廣面積使用本品時，有產生類似全身投與類固醇時所生之副作用之虞。
3. 封閉性包敷的狀況下易造成皮膚大量吸收本品，嬰兒之紙尿布亦屬封閉性包敷。
4. 長期、高劑量或體表大面積的使用本品，可能會導致腎上腺抑制作用，特別是嬰幼兒。與成人相較兒童可能會吸收較大量的局部類固醇而易生全身性毒性。
5. 禁忌：
 - a. 對Crotamiton過敏者。
 - b. 水痘、接種疫苗後皮膚發疹，皮膚結核及梅毒性皮膚感染、病毒感染性皮膚病。
 - c. 燒、燙傷、凍傷患者。
6. 副作用：

局部皮膚刺激，如變紅、鱗片剝落、發癢、灼熱感、皮膚萎縮、多毛、毛細血管擴張、紫斑、色素脫失等可能偶會發生在治療之初。
7. 對於孕婦及嬰幼兒之使用，安全性尚未確立，故應避免長期、大劑量且廣面積之使用。
8. 小心不要接觸到眼睛及粘膜部份，如不幸發生應立即用大量水徹底沖洗。

【包 裝】：1000公克以下鋁管、瓶裝

N.W.



內外化學工業股份有限公司

臺灣省雲林縣斗六市工業區復興路3號