祛痰劑

FEG-004
衛署藥製字第041920號

YSP

理冒 祛痰 顆粒

Fucole **Expectorant** Granules

咳嗽乃人體正常的反應，特別是呼吸道黏膜受到刺激或感染時最爲常見。咳嗽又分無痰的乾咳及有痰的濕咳，其中又以濃稠的痰液最不容易咳出，同時也最令人感到不舒服。本藥爲一良好的祛痰劑，適時地給予能降低濃痰黏稠度並協助痰液的咳出而改善呼吸道不適的症狀。

【成　　分】每公克中含：

Acetylcysteine.....66.67mg

【賦　形　劑】

Sucrose、Mannitol、Potato Starch、Polyvinylpyrrolidone、Aspartame、Sodium Citrate、Milk Flavor、Orange Powder、Sunset Yellow FCF Aluminum Lake。

【作　　用】

1. Acetylcysteine爲一祛痰劑，可藉由破壞粘性蛋白之雙硫鍵而溶解濃稠痰液，並藉降低分泌物之粘稠度而促進痰液的咳出。
2. 本藥能調整呼吸道粘膜及分泌物之正常化，因而保護呼吸道及維持其暢通性。

【適　應　症】

減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

【用法・用量】

一天3次，於飯前服用。
成人每次1包；12歲以上，適用成人劑量。
6歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2。
3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之1/4。
3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治。
醫師藥師藥劑生指示藥品。



【注 意 事 項】

1. 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量。
5. 服藥後若有不適情況發生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
6. 本藥不得與含酒精飲料併服。

【警　　語】

1. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾患（包括如慢性支氣管炎、肺氣腫）所引起之咳嗽，及伴有濃痰之咳嗽病人請勿自行使用。
2. 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上之咳嗽，或有復發現象，應洽醫師。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
   1) 3歲以下，請洽醫師診治。
   2) 曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。
4. 本劑因會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如遇自然咳出困難時，宜採用機械吸引、拍痰或變換姿勢等適當的處理步驟。
5. 除非有醫師藥師藥劑生指示，下列情況不建議自行使用：
   1) (支氣管性)氣喘及伴有呼吸功能不全之病人。
   2) 高齡者。
6. 本藥含Acetylcysteine，使用後若有以下症狀發生，應立即停藥就醫：
   1) 消化道：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。
   2) 偶有發疹等過敏症狀。
   3) 其他：偶有血痰、惡寒、發熱、鼻漏、口內炎等症狀發生。
7. 本藥宜空腹服用。

【副　作　用】

輕微的暈眩、思睡、噁心、嘔吐及胃痛。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【給痰液不易咳出患者的建議】

1. 多喝熱水或飲料，稀釋痰液以利咳出。
2. 少食用甜份太高的食物或飲料而增加痰液粘稠度。
3. 避免服用含辛辣或刺激性成分之食物或飲料。
4. 儘量在濕度高的溫暖房間，以稀釋支氣管中的痰。

【包　　裝】

6～333包鋁箔袋盒裝，每包3公克。

★如果您對本產品在使用上有任何的疑問，請逕洽居家用藥諮詢專線**0800-012-679**，本公司專業藥師將竭誠為您服務。

YUNGSHIN
永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電　　話：（04）26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2149877