衛 02011

仿單標籤粘貼表

產品名稱	"強生"希利治林錠5公絲	申請廠商	強生化學製藥廠有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製字第 041927 號		

Reg. No.:041927 100Tab.

SELEZIN TABLETS 5mg. "JOHNSON"
(Selegiline)

COMPOSITION
Each tablet contains:
Selegiline Hydrochloride
5mg.

JCP


巴金森氏症治療劑
"強生"希利治林錠5公絲

【適應症】巴金森病症之輔助治療劑。
【用法・用量】通常初劑量爲每日1～2錠，即於早晨服用1錠，如有需要於晚上再服用1錠，數週後劑量可減半，1日之最大劑量爲2錠，切勿超量，併用本劑時Levodopa之劑量約可降低10%，本藥須由醫師處方使用。
【注意】請詳閱說明書後使用。
衛署藥製字第041927號 (G-6159)

台灣省・台北縣
強生化學製藥廠有限公司
三重市三和路四段77號

Mfg. Date:
Lot No.:
Exp. Date:

87. 4. 20



加在神經原內之Dopamine的濃度，本劑與Levodopa併服時可確保在腦紋狀體中Dopamine之高度功能，因此可降低Levodopa之用量，本劑也可加強Levodopa之效能，縮短起效期間並延長作用時間，由於本劑不會抑制其他單胺之障礙，故不致導致高血壓，本劑可由胃腸道迅速且完全吸收並穿過血腦障壁，投與後約30至60分鐘即可

Reg. No.:041927 100Tab.

SELEZIN TABLETS 5mg. "JOHNSON"
(Selegiline)

COMPOSITION
Each tablet contains:
Selegiline Hydrochloride
5mg.

JCP

巴金森氏症治療劑
"強生"希利治林錠5公絲

【適應症】巴金森病症之輔助治療劑。
【用法・用量】通常初劑量爲每日1～2錠，即於早晨服用1錠，如有需要於晚上再服用1錠，數週後劑量可減半，1日之最大劑量爲2錠，切勿超量，併用本劑時Levodopa之劑量約可降低10%，本藥須由醫師處方使用。
【注意】請詳閱說明書後使用。
衛署藥製字第041927號 (G-6159)

台灣省・台北縣
強生化學製藥廠有限公司
三重市三和路四段77號

Mfg. Date:
Lot No.:
Exp. Date:

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS LTD.
TAIPEI HSIEN, TAIWAN

G-39

※外文仿單應檢附中文譯本

№ 070255

衛 02011

仿單標籤粘貼表

產品名稱	"強生"希利治林錠5公絲	申請廠商	強生化學製藥廠有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製字第 041927 號		

Reg. No.:041927 100Tab.

SELEZIN TABLETS 5mg. "JOHNSON"
(Selegiline)

COMPOSITION
Each tablet contains:
Selegiline Hydrochloride
5mg.

JCP
JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS LTD.
TAIPEI HSIEN, TAIWAN

巴金森氏症治療劑
"強生"希利治林錠5公絲
【適應症】巴金森病症之輔助治療劑。
【用法・用量】通常初劑量爲每日1～2錠，即於早晨服用1錠，如有需要於晚上再服用1錠，數週後劑量可減半，1日之最大劑量爲2錠，切勿超量，併用本劑時Levodopa之劑量約可降低10%，本藥須由醫師處方使用。
【注意】請詳閱說明書後使用。
衛署藥製字第041927號 (G-6159)
台灣省・台北縣
強生化學製藥廠有限公司
三重市三和路四段77號
AG39c-870323 G-39

Mfg. Date: 87. 4. 20
Lot No.:
Exp. Date:

BG39－870302 (5,000)

巴金森氏症治療劑

"強生"希利治林錠5公絲

SELEZIN TABLETS 5mg (Selegiline) "JOHNSON"

衛署藥製字第041927號 (G-6159)

【作　　用】本劑為B型選擇性單胺氧化酵素抑制劑(B-MAOI)，能增加在神經原內之Dopamine的濃度，本劑與Levodopa併服時可確保在腦紋狀體中Dopamine之高度功能，因此可降低Levodopa之用量，本劑也可加強Levodopa之效能，縮短起效期間並延長作用時間，由於本劑不會抑制其他單胺之障礙，故不致導致高血壓，本劑可由胃腸道迅速且完全吸收並穿過血腦障壁，投與後約30至60分鐘即可達到最高血中濃度，服用本劑1或2錠在24小時內平均63.3%呈Methylamphetamine代謝物及15.1%呈Amphetamine代謝物由尿液而排泄。

【成　　分】每錠含有：Selegiline Hydrochloride……5mg.

【適　應　症】巴金森病症之輔助治療劑。

【用法・用量】通常初劑量為每日1～2錠，即於早晨服用1錠，如有需要於晚上再服用1錠，數週後劑量可減半，1日之最大劑量為2錠，切勿超量(因不但未能改善病情，反而會增加Levodopa副作用的發生)，併用本劑時Levodopa之劑量約可降低10%，本藥須由醫師處方使用。

【禁　　忌】對本劑有過敏性之患者禁忌使用。

【副　作　用】噁心、嘔吐、精神錯亂、精神激越、幻覺、運動困難、低血壓、胃腸不適。

【包　　裝】6～1,000錠鋁箔盒裝及塑膠瓶裝。

JCP

Code No.: G－39

強生化學製藥廠有限公司
JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS LTD.
臺灣省臺北縣三重市241533三和路四段77號
訂貨專線：(02)29894756　FAX:(02)29712579
工廠電話：(02)22878405

國外文仿單應檢附中文譯本

№ 070255