



LOB-004
衛署藥製字第041957號

樂定®
(乙醯安酚)
Lotion Children's Suppositories
160mg



發燒雖然是身體免疫系統運作的正常反應，有許多的原因會導致身體發熱，如：感染、外傷、慢性疲勞及其他身體疾病，但適當的退燒也是必需的。小孩發熱是家長最難處理的症狀，而過量的退燒藥物的原因。而過量的退燒藥物的原因。而過量的退燒藥物的原因。而過量的退燒藥物的原因。

-Acetaminophen與肛門深部直腸投藥，吸收迅速，對胃腸刺激性低，兒童患者使用甚為方便及安全。

【用法】
1. 本藥係經由肛門深部直腸投藥，吸收迅速，對胃腸刺激性低，兒童患者使用甚為方便及安全。
2. 本藥具有理想的解熱、鎮痛作用，對於各類型發熱與肌肉、關節以及周圍神經系所引起之中度疼痛具有優異的緩解作用。

【成分】
有效成分及含量：每粒中含：Acetaminophen.....160 mg
其他成分（賦形劑）：Hydrogenated Vegetable Glycerides、Propylene Glycol。

【用途】
退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。

【使用上注意事項】
一、有下列情形者，請勿使用：
1. 腸因本藥成分引起過敏。
2. 有下列情形者，請洽醫師診治：
1.6歲以下。
2. 成人連續使用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。
3. 有肝臟疾病的人。
二、有下列情形者，請洽醫師診治：
1. 兒童、孕婦、可能懷孕女及哺乳期。
2. 同時服用Acetaminophen或其成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
三、有下列情形者，請用前請先諮詢醫師藥師藥劑師藥劑生：
1. 兒童、孕婦、可能懷孕女及哺乳期。
2. 當服用Acetaminophen或其成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
四、其他使用上注意事項：
1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 烏頭素。

4. 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
5. 限使用於肛門。如能塗塗因太軟而變形，請勿使用。
6. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。

【用法用量】

年齡	使用頻率
6歲以上未滿12歲	每次1顆
6歲以下之幼童	請洽醫師診治，不宜自行使用

發燒或需要時使用，若症狀持續，則每4~6小時可重複使用，每24小時內不可超過5次。本藥不得剝半使用。

①由塑膠片上撕開一個。
②由指示處撕開塑膠後取出。

【剝取栓劑之方法】
【栓劑之插入法】
如上圖。用食指輕按栓劑之底部，再插入肛門內。

【警語】
一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1. 若有任何不適情況產生。
2. 使用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
3. 使用過量(每日超過4,000毫克(mg))，或服用藥後出現下列症狀：
胃腸道不適、腹食、嘔吐、嘔白及出汗等。
4. 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、毒麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及匉吐。

永信藥品工業有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電話：(04) 26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工業路27號


2149826



【包裝】
2~100顆塑膠盒貯藏。

【保存上之注意】
1. 為保持本栓劑之品質，請放置於陰涼或避免日光直射之處。
2. 為避免小孩隨意取用，請置於小孩不易取得之處。
3. 請在有效期限內使用。

【特別】
醫師藥師藥劑生指示藥品。



【注意】
本栓劑之配製，旨在於體溫融化後，即呈現效果。故保存之溫度高於體溫時，極易產生軟化，變形等現象。尤其在夏天更易產生融化之現象，然栓劑之效果，絕不致發生變化。如產生軟化，而致使用困難時，請按下記方法，俟凝固後，再行使用。

1. 栓劑之形體變形時，照原塑膠包裝形態，浸入於溫水(約40~50°C)中。

2. 全部如軟化或融化時，請按右圖，浸於冷水中(20°C以下)即可凝固。

2149826