

“生達”

新克菌

膜衣錠100公絲
(諾弗酒欣)

Noraxin F.C. Tablet 100mg

(Norfloxacin)

"Standard"

“生達”新克菌膜衣錠係屬於Pyridone carboxylic acid中之Fluoroquinolone 衍生物之廣效抗菌劑，本品在 Pyridone carboxylic acid結構中分別導入Fluorine與 Piperazine 環，對現有Pyridone carboxylic acid系藥物不具抗菌力的革蘭氏陽性菌呈現強大的抗菌力，另外對革蘭氏陰性菌的效力比現有的Pyridone carboxylic acid系藥物 (如Nalidixic acid 及Pipemidic acid)優異，且對於會產生抗藥性的細菌有抗菌效果。

本品口服後迅速穿透進入組織且大部份以原型進入尿液排泄。臨床上用於上呼吸道感染，皮膚感染、泌尿道感染有治療效果。

成 分： Each tablet contains:

Norfloxacin 100mg

作用特點：

1. Norfloxacin主要作用於DNA gyrase。藉著抑制細菌DNA gyrase的活性來阻礙細菌DNA的合成複製，而具有殺菌作用。
2. 健康成人投與本品200mg，1小時後達血中最高濃度1.14mg/ml。生物半衰期2.74小時，0~2 小時達尿中最高濃度，尿中排泄物80%為原型。
3. 本劑對於大腸桿菌、綠膿桿菌和鋸桿菌等革蘭氏陰性菌的抗菌效力，比Nalidixic acid、Pipemidic acid優異，對於葡萄球菌、鏈球菌等革蘭氏陽性菌亦顯出強大的抗菌效力。
4. 由後代培養，以產生抗藥性的實驗中得知本劑比Nalidixic Acid及 Pipemidic Acid更不易產生抗藥性，因此用於對Nalidixic Acid有抗藥性的革蘭氏陰性菌，對Gentamycin 具有抗藥性的綠膿桿菌及對Ampicillin具有抗藥性的金黃葡萄球菌等亦顯示出有強大的抗菌效力。

適應症：

表淺性皮膚感染、泌尿道感染及赤痢菌引起之腸道感染。

用法用量： 本藥須由醫師處方使用。

通常成人每次100~200mg，每天3~4次，或每次400mg，每天1~2次，飯後1~2 小時後服用，可依症狀適宜增減之。

副作用：

1. 過敏症：偶有發疹、發紅、瘙癢感等過敏症狀，但極少發生，若有這種症狀發生，應中止投與。
2. 腎臟：偶有 BUN、Creatinine上升。又因類似化合物 (Piromidic Acid)之投與、曾發生疑似腎障礙例症之報告。
3. 肝臟：偶有SGOT、SGPT、ALP、血清Bilirubin值上昇。
4. 消化器官：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、腹痛、腹部膨滿感、下痢；偶而也會有便秘、口唇炎、口角炎等症狀出現。

- 5.血液：偶有嗜酸球增多、白血球減少，又間有紅血球減少，血紅素減少，但極少發生。故應注意觀察，認為有異常時，即中止投與。
- 6.其他：偶有光敏感症、眩暈、頭痛、不眠、全身倦怠感、麻木感、冷感、熱感、浮腫、心悸亢進、胸痛出現，但極少發生。

注意事項：

- 1.對於quinolone類衍生物有過敏症往歷之患者，禁止投與。
- 2.研究指出投與Norfloxacin可能有輕微的尿結晶出現，故病患於治療期間應飲用足夠水份。
- 3.有高度腎障礙的患者須慎重投與，調整劑量如下表：

$$\text{男性} = \frac{\text{體重(Kg)} \times (140 - \text{年齡})}{72 \times \text{Serum creatinine (mg/100ml)}}$$

$$\text{女性} = \text{上述值} \times 0.85$$

- 4.服用Norfloxacin若暴露在陽光下有時會產生光敏感性，若出現此種現象時，則中止投與。
- 5.服用Norfloxacin可能會導致輕微的眩暈、頭痛，故不宜駕駛及操作危險性機械。
- 6.對於小孩、孕婦及授乳婦的安全性立，故對於此類患者應判斷治療上的益處超過危險性時才投與。
- 7.副作用報告顯示Fluoroquinolone類抗菌劑可導致肌腱炎或肌腱斷裂，若有肌腱疼痛、發炎斷裂之情形，應立即停藥。

警 語：

本藥品具有使重症肌無力惡化之風險，具有重症肌無力患者應避免使用。

貯 存：本劑應於25°C以下避濕、避光保存。

賦形劑：

Microcrystalline Cellulose , Sodium Starch Glycolate , Polyvinylpyrrolidone K30 , Sodium Stearyl Fumarate , Hydroxypropyl Methylcellulose , Polyethylene Glycol 4000 , Titanium Dioxide , Food Yellow No. 4 Al. Lake , Water Purified , Alcohol 95%

包 裝：6~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第042459號 G-6386 Code No. TN-08 2212040



PIC/S GMP藥廠
生逢化學製藥股份有限公司
台南市新營區土庫里土庫6之20號