衛署藥製字第042461號
G-6388
Code No:1817

“井田”防栓塞®腸溶微粒膠囊100公絲
(乙醯水楊酸)

FUSEN® Enteric-Microencapsulated Capsules 100mg"Chinteng"
(Aspirin)

【成　　分】：每膠囊中含：(Each E.M. Cap contains):
Aspirin.....100mg

【作　　用】：
(1)本藥可經由促進環氧酶(Cyclo-oxygenase)之乙醯化而有效抑制循環內血小板Thromboxane之生成，並進而緩解血管之痙縮及防止血小板之凝集。
(2)本藥之抗血小板凝集效應，可延緩或降低血栓性栓塞疾病之發生及惡化。
(3)本藥亦可抑制Thromboxane於門脈循環中之生成，且經由系統前代謝(肝代謝)後大多形成對血小板凝集不具影響性之代謝物Salicylate。因此，進入全身循環內之Acetyl Salicylic Acid濃度極低，故殆不會抑制Prostacyclin之形成，而干擾藥效的發揮。
(4)本藥內含以Acetyl Salicylic Acid爲主成分之腸溶微粒，可防止藥物於胃中崩散而造成胃腸不適，並可藉由微粒之穩定釋放效果，使患者獲得更安全、更有效的治療成果。

【適 應 症】：預防心肌梗塞，預防心栓性栓塞症、男性短暫性缺血性發作。

【用法用量】：每日一粒配服開水服用。本藥須由醫師處方使用。

【禁 忌 症】：(1)曾對本藥產生過敏反應之患者禁用本藥。
(2)嚴重肝、腎疾患、血友病或其他出血性疾患、糜爛性胃炎或消化性潰瘍患者禁用之。
(3)懷孕第3期。

【一般注意】：(1)由於本藥使用後會延長出血時間，故欲接受手術之患者應於手術前一週停藥。
(2)曾經因使用Acetyl Salicylic Acid發生氣喘之患者或消化性潰瘍患者應小心使用。
(3)本藥與抗凝血劑併用時宜謹慎監測血液之凝集情形。

【孕婦、授乳婦之投與】：本藥使用孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，而懷孕末期之孕婦應避免服用。

【新生兒、乳兒之投與】：由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】：本藥服用後，若發生過敏或不適現象(如發疹、搔癢等)，請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副 作 用】：一般而言，依指示每日服用一粒所產生之副作用極為輕微偶有胃腸不適、噁心、嘔吐、胃粘膜受損、潰瘍及隱發性血液流失現象，而如眩暈、耳鳴、暫時性耳聾及代謝性酸中毒則與高劑量之投與有關。

【保存上之注意】：(1)本藥應置於小兒伸手不及處，以免小孩誤食，造成危險。
(2)室溫(15～30℃)儲存。
(3)請依外包裝標示，於有效期限內使用完畢。

【警語】：
1. 不得併服含酒精飲料，因可能造成胃出血。
2. 本藥不宜使用於12歲以下兒童，亦不宜使用於18歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病-雷氏症候群（Reye's Syndrome）有相關性。
3. 蠶豆症（6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate DehydrogenaseDeficiency）患者，不宜服用本藥。

【包　　裝】：2~1000粒瓶、鋁箔盒裝。

【儲存條件】：請置於25℃以下，並避光存放

C.G.M.P.®
井田製藥工業股份有限公司
CHIN TENG PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO.,LTD.
台灣台中市大甲幼獅工業區工九路九號
TEL：(04)26814585-7(三線)
訂購專線：(0800)461461