

“長安”

外用

# 濕疹乳膏

Eczema Cream “C.A.”

【成分】： Each gm Contains：

Diphenhydramine Hydrochloride .....20 mg  
Fluocinolone Acetonide .....0.5 mg

【賦形劑】：

Methyparaben, Butylparaben, Stearyl Alcohol, Propylene Glycol, Span 60, Vaseline, Paraffine, Tween 60, Purified Water.

【適應症】：

濕疹或皮膚炎及暫時緩解皮膚搔癢。

【用法用量】：

每日 3~4 次，塗於患部。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【副作用】：

- A. 局部性：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痂子、毛細管擴張。
- B. 全身性：庫欣氏症候群(Cushing's syndrome，如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)、繼發性腎上腺功能不足(secondary adrenal insufficiency，如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

【注意事項】：

- 1.須置於小孩接觸不到之處。
- 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 5.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本劑製限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或粘膜。
- 6.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
- 7.使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
- 8.除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥請勿覆蓋，以免增加副作用。
- 9.塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- 10.深部皮膚組織感染請就醫治療。
- 11.黴菌治療至少二星期，使用此藥須完成全程療程。
- 12.一般黴菌治療一星期症狀會改善，股癬和體癬經二星期，足癬經四星期治療症狀若沒有改善應立即停藥就醫，即使若症狀有改善停藥後若病情復發應停藥立即就醫。
- 13.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇或非類固醇抗發炎劑，不可連續使用超過二星期。

【警語】：

- 1.對藥物各成分過敏者不得使用。
- 2.小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
- 3.癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
- 4.臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
- 5.皮膚的黴菌感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
- 6.連續使用超過三星期時有增加過敏性接觸性皮膚炎之虞。

【包裝規格】 1000 公克以下鋁軟管裝

衛署藥製字第 042671 號

長安化學工業股份有限公司

彰化縣福興鄉福興工業區福工路 19 號