

警告：

本品不能用來治療精神病患，也不能替代適當之精神病療法。因為具有抑制CNS的功效。同樣理由，正接受本品治療之患者，對於酒精及其他CNS抑制劑應保持謹慎。對於孕婦之胎兒，本品很可能造成傷害，如果懷孕期間使用本品或正在用藥時懷孕，應當評估對胎兒的危險性。

警語：

依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial，RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

注意事項：

如突然停藥或迅速減量曾有禁戒發作之報導。本品是用在嚴重抑鬱病人或是有自殺傾向及計畫之人。如果長期和/或大量使用benzodiazepine之藥物，可能產生成癮和情緒、心理依賴性，因此，即使你覺得此藥"已不再有效"也別提高劑量。切勿斷然停藥，因為會有戒斷症狀產生。

使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生的藥品交互作用。

交互作用：

benzodiazepine類藥物(包括本品)當併用其他影響神志、抗痙攣或抗組織胺、乙醇等抑制CNS的製劑時，會加成抑制CNS的效果。

懷孕：

畸胎影響：母親使用benzodiazepine，生育之子女出生後一段期間也許會有戒斷症狀的危險；同時還有新生兒無力的報導。

授乳：

必須使用本品的母親們不應哺乳。

用於兒童：

對18歲以下兒童之安全性和有效性尚未建立。

本藥須由醫師處方使用。

包裝：

Gendergin Tablet (alprazolam)：
0.25mg, 2~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。
貯存在室溫15~30°C(59~86°F)之下。

健亞生物科技股份有限公司 製造

新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號

IT017D2

