

艾立通腸溶微粒膠囊 10 公絲
Eliton E. Microen Capsules 10mg

【成分】每粒腸溶膠囊含

Bisacodyl.....10mg

【劑型】

艾立通腸溶微粒膠囊是一種膠囊內充填粉紅色腸溶圓型微粒 (PELLETS) 之特殊劑型，其有效成分不在胃溶化，到了腸中才會溶化產生特效，所以不傷胃。艾立通腸溶微粒膠囊，除了腸溶的效果，且因為微粒膠囊劑型有別於一般錠劑劑型，能降低局部刺激性，促進藥物之安定性，具有獨特的藥物釋放性。

【適應症】緩解便秘。

【用法用量】

成人每天 1 次，每次 1 粒。於睡前（或空腹時）服用。初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。12 歲以上，適用成人劑量。

6 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2。

3 歲以上未滿 6 歲，適用成人劑量之 1/4。

未滿 3 歲之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

腸溶製劑應整粒吞服，不得剝半或嚼碎。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 五、瀉劑不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示，不得連續使用一星期以上，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

【警語】

- 一、除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。
- 二、除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
- 三、內服製劑使用期間，若有噁心、嘔吐、嚴重腹痛或發疹等過敏症狀時，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 四、若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
- 五、使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
- 六、使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
- 七、除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿 3 歲之嬰兒不得使用。
- 八、禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。
- 九、長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。
- 十、含 Bisacodyl 之腸溶製劑須整粒吞服，不得咬碎或磨粉，且使用藥前一小時不得使用制酸劑或牛乳。

【賦形劑】Sugar Spheres、Hydroxy Propyl Methyl Cellulose 3cps、Polyethylene Glycol 6000、Talc、Eudragit L30D-55、Triethyl Citrate。

【硬空膠囊】主成分：明膠。賦形劑：純水、甘油、硫酸月桂酯鈉、食用紅色六號、食用黃色四號。

【保存條件】本品應於陰暗處保存。

【包裝】2-1000 粒玻璃瓶、PTP/鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 043021 號