

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	禦風寧日膜衣錠	申請廠商	寶齡富錦生技股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製字第 043183 號		

禦風寧日膜衣錠

Tylencough Day F.C. Tablets

綜合感冒劑

作用特點：

1. Dextromethorphan HBr 為鎮咳劑，可達到鎮咳效果。
2. dl-Chlorpheniramine Maleate 為抗組織胺，可緩解過敏症狀。
3. Acetaminophen (Paracetamol) 為解熱鎮痛劑，能緩解輕度至中度之疼痛(如感冒引起的疼痛)；降低上昇體溫(解熱作用)；不刺激胃。
4. Pseudoephedrine HCl 作用於血管平滑肌，使鼻黏膜及支氣管黏膜血管收縮，緩解鼻咽腔之過度分泌，對鼻塞有效。

成分：Each Tablet contains：

Acetaminophen (Paracetamol)	300mg
Pseudoephedrine HCl	30mg
Dextromethorphan HBr	15mg
dl-Chlorpheniramine Maleate	2mg

適應症：緩解感冒之各種症狀

(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽)

用法用量：一日 3-4 次。成人每次一錠，

12 歲以上，適用成人劑量。

9 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2。

6 歲以上未滿 9 歲，適用成人劑量之 1/3。

未滿 6 歲之兒童，請洽醫師診治，不宜自行使用。

注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生或指示，請注意下列事項：
(一) 孕婦及授乳婦不建議自行使用。
(二) 服用本藥時不得併服其他藥品。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 不得併服含酒精飲料。

警語：

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
(一) 6 歲以下不建議自行使用。
(二) 曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。
3. 患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
4. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
5. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
6. 吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
7. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
8. 不要服用本藥超過 7 日。
9. 服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
10. 服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
11. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen (Paracetamol) 可能造成肝損害。
12. 本藥含抗組織胺成分，應注意下列事項：
(一) 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要合併飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
(二) 除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
13. 服用 Monoamine oxidase inhibitor (MAOI) 或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑 (Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI)) 者，不得使用含 Dextromethorphan 之本藥。
14. 本藥含 Pseudoephedrine Hydrochloride 應注意下列事項：
(一) 除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用本藥。
(二) 服用 Monoamine oxidase inhibitor (MAOI) 期間、或停用 MAOI 兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥物是否含有 MAOI，請詢問醫師或藥師。

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	禦風寧日膜衣錠	申請廠商	寶齡富錦生技股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製字第 043183 號		

15. 肝毒性：

- (一) 使用 acetaminophen (paracetamol) 曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日 4,000 毫克的 acetaminophen 所致，且多涉及使用超過一種以上含 acetaminophen 成分之藥品。
- (二) 過量服用 acetaminophen 可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有 acetaminophen 成分之藥品，因而造成用藥過量。
- (三) 有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用 acetaminophen 期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有 acetaminophen 或 paracetamol 成分，不可同時使用超過一種以上含有 acetaminophen 成分之藥品。如果一天誤服超過 4,000 毫克的 acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。

16. 與酒精併用：不得併服含酒精飲料，因為 acetaminophen 可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用 acetaminophen 而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用

17. 過量：

- (一) 服用過量 acetaminophen 會在服藥 24 小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
- (二) 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。
- (三) Acetaminophen 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後 48-72 小時才明顯可見。

18. 過敏/過敏性反應：上市後曾有發生與使用 acetaminophen 相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、瘙癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對 acetaminophen 過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

19. 嚴重皮膚反應：使用 acetaminophen 的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿胞病 (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)、史蒂文生氏-強生症候群 (Stevens - Johnson Syndrome, SJS) 和毒性表皮壞死溶解症 (Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

賦形劑：

Talc、Magnesium Stearate、FD&C Red No. 3 (Erythrosine)、Polyvinylpyrrolidone、Croscopovidone、Hydroxypropyl Methylcellulose、Polyethylene Glycol、Titanium Dioxide、Microcrystalline Cellulose、Magnesium Aluminometasilicate

儲存條件：儲存於 25°C 乾燥陰涼處。

包裝：6-28 錠 PTP 鋁箔盒裝

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第 043183 號 G-6804

製造廠：寶齡富錦生技股份有限公司 平鎮廠

廠址：桃園市平鎮區興隆路 266 號

