

“達德士”鼻感寧錠

Becandin Tablet "DTS"

衛署藥製字第043222號
GMP G-6827

作用：

Pseudoephedrine HCl為一腎上腺激素，經由內因性腎上腺素胺類釋出之間接作用而刺激 α ， β_1 和 β_2 腎上腺激素接受體(Adrenergic receptor)，而呈現相關的藥理作用，使鼻黏膜血管之收縮作用增加，緩解鼻腔或耳咽管之充血現象，進而可解除由一般感冒、上呼吸道感染、枯草熱所引起如鼻塞、過敏、流鼻涕、打噴嚏等症狀。

Triprolidine HCl為一抗組織胺藥物，與Histamine競爭H1接受體，故可緩解過敏的症狀，如過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎、沒有併發症之尋麻疹。

成份：每錠含：

Pseudoephedrine HCl.....60mg
Triprolidine HCl.....2.5mg

賦形劑：

Dibasic calcium phosphate dihydrate、Microcrystalline cellulose、Povidone K-30、Sodium starch glycolate、Silicon dioxide、Magnesium stearate.

適應症：

季節性、過敏性鼻炎及血管運動性鼻炎所伴生打噴嚏、鼻塞、流鼻水之緩解。

用法用量：

通常成人及12歲以上之小孩每次一錠，6~12歲1/2錠，每日3~4次經口投與之。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1. 本藥禁用於下列患者：新生兒、早產兒、授乳婦、下呼吸道疾患(包括氣喘)、對本藥過敏者或正在使用MAO Inhibitor治療之患者。
2. 本藥對於下列患者宜慎重使用之：眼壓過高、狹窄性消化性潰瘍、幽門十二指腸阻塞、前列腺肥大、膀胱頸阻塞、高血壓、糖尿病、缺氧性心臟疾患、甲狀腺亢進症。
3. 孕婦使用本藥之安全性尚未確立，宜衡量利弊慎重投與之。
4. 本藥投與小孩時，可能有輕微興奮或鎮靜之現象發生，但對於幼兒則興奮之情形較多。
5. 本藥服用時偶有發疹、口乾、嗜眠、眩暈、頭痛、心悸、胃痛、支氣管分泌液減少等副作用。

包裝：6-1000錠PTP鋁箔盒裝。

貯存方法：請置於避光，陰涼，防潮，25°C以下保存。

委託者：達德士藥品有限公司
地 址：臺北市北投區承德路7段348號9樓
製造廠：羅得化學製藥股份有限公司
地 址：台中市大甲區東西七路一段65號