抗凝血、抗血栓劑

ACT10-002
衛署藥製字第043254號

YSP

恩達®

腸溶膜衣錠 100公絲

Antache®

Enteric Coated Tablets
100mg

乙醯水楊酸（Acetyl Salicylic Acid，以下簡稱ASA）是傳統用於解熱鎮痛的藥物，近年來醫藥界的臨床研究發現，ASA具有預防中風及缺血性心臟病發作的功效，尤其是投與低劑量ASA後，對Thromboxane A2（一種血管收縮素）的合成可產生不可逆性之阻斷作用，因而減少血栓形成。但是高劑量ASA投與，卻會抑制血管內皮中Prostacyclin（一種血管鬆弛素）之生合成，因而降低了防治心肌梗塞的效果。恩達腸溶膜衣錠，含有低劑量乙醯水楊酸，爲長期防治心血管性疾病之選擇用藥，而且其精心設計之腸溶膜衣錠劑型，不但可降低藥物對胃腸之刺激性又可確保投藥後之有效性。

【成　　分】每錠中含：

Aspirin (Acetyl Salicylic Acid)·····100mg

【賦　形　劑】

Lactose、Hydroxypropyl Cellulose、Glyceryl Behenate、Silicon Dioxide Colloidal、Crospovidone、Microcrystalline Cellulose、Hydroxypropylmethylcellulose、Polyethylene Glycol 6000、Cochineal Red A、Methacrylic Acid Copolymer、Triacetin。

【作　　用】

1. 本藥可經由促進環氧酶（Cyclooxygenase）之乙醯化而有效抑制循環內血小板Thromboxane之生成，進而緩解血管之痙縮及防止血小板之凝集。
2. 本藥之抗血小板凝集效應，可延緩或降低血栓性栓塞疾病之發生及惡化。
3. 本藥亦可抑制Thromboxane於門脈循環中之生成，且經由系統前代謝（肝代謝）後大多形成對血小板凝集不具影響性之代謝物Salicylate。因此，進入全身循環內之Acetyl Salicylic Acid濃度極低，殆不會抑制Prostacyclin之形成，而干擾藥效的發揮。
4. 本藥爲含有以Acetyl Salicylic Acid爲主成分之腸溶膜衣錠，可防止藥物於胃中崩散而造成胃腸不適，並可藉由腸溶膜衣之穩定釋放效果，使患者獲得更安全、更有效的治療成果。

【適　應　症】

預防心肌梗塞及心栓性栓塞症、男性短暫性缺血性發作。

【用法．用量】

每天一次，一次一錠。請與水吞服，腸溶錠不可磨碎或咀嚼。
本藥須由醫師處方使用。

【警　　語】

1. 不得併服含酒精飲料，因可能造成胃出血。
2. 本藥不宜使用於12歲以下兒童，亦不宜使用於18歲以下兒童及青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病–雷氏症候群(Reye's Syndrome)有相關性。
3. 蠶豆症（6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏症，Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency）患者，不宜服用本藥。

【禁　忌　症】

1. 嚴重肝、腎疾患、血友病或其他出血性疾患、糜爛性胃炎或消化性潰瘍患者禁用之。
2. 對本藥曾有過敏病史的患者不建議使用。
3. 懷孕第3期婦女：不得使用。

【一 般 注 意】

1. 由於本藥使用後會延長出血時間，故欲接受手術之患者應於手術前一週停藥。
2. 曾經因使用Acetyl Salicylic Acid發生氣喘之患者或消化性潰瘍患者應小心使用。
3. 本藥與抗凝血劑併用時宜謹慎監測血液之凝集情形。

【孕婦、授乳婦之投與】

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，而懷孕末期之孕婦應避免服用。
本藥雖僅少量分泌至乳汁中，授乳婦需先經醫師評估用藥得失方可使用本藥。

【新生兒、乳兒之投與】

兒童及青少年不建議給與本藥。

【使用後之注意】

本藥服用後，若發生過敏或不適現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副　作　用】

本藥耐受性良好，依指示每日服用1錠所產生副作用極為輕微，針對部份患者偶有胃腸不適、噁心、嘔吐、胃粘膜受損、潰瘍及隱發性血液流失現象。而如眩暈、耳鳴、暫時性耳聾及代謝性酸中毒等副作用則與高劑量之投與有關。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包　　裝】

2～1000錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

YUNGSHIN®
永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電　　話：（04）26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2150581