註 （1）報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。
（2）仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

咳精 膠囊 Cosso-Nil Capsules

本處方參考日本醫藥品局方，係針對「咳」、「痰」部份有效施展作用之五種鎮咳祛痰成份所調配之方劑，於治療劑量下，服用安全。對於惱人之咳嗽及伴隨之諸症狀服用「咳精膠囊」可有效的抑制咳嗽。

【成分】有效成分及含量：Each Capsule Contains：

Noscapine..... 20 mg
Dextromethorphan Hydrobromide..... 20 mg
Carbinoxamine Maleate..... 4 mg
DL-Methylephedrine Hydrochloride ..... 25 mg
Potassium Guaiacolsulfonate..... 90 mg
其他成分(賦形劑)：Lactose, Sodium starch glycolate, Silicon dioxide AD102, Magnesium stearate, Talc (膠囊成分)：Gelatin, Sodium lauryl sulfate, Titanium dioxide, Brilliant blue FCF, Tartrazine, Purified water, Pharmaceutical printing ink-grey ink

【用途(適應症)】鎮咳、祛痰。

【使用上注意事項】：
一、有下列情形者，請勿使用：
1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
2. 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。
3. 12 歲以下。
二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
2. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。
3. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
4. 有心臟病及65歲以上的人。
三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、 止痛或退燒等藥品。
3. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
四、其他使用上注意事項：
1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用劑量。
4. 不要服用本藥超過七日。
5. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
6. 不得與酒精性飲料併用。

【用法用量】

成人	1次1粒，1日3次。

【警語】：
一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1. 若有任何不適情況產生。
2. 咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
3. 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
4. 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。

【包裝】6-1,000粒/罐、鋁箔盒裝。

【貯存】貯存於25℃以下乾燥處。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品　衛署藥製字第043297號G-6855

【藥效藥理作用】

◎Noscapine
能抑制延腦咳嗽中樞，反制咳嗽反射，並具有支氣管擴張作用。本品不會抑制呼吸道的正常分泌且不會影響痰液的排出。

◎Dextromethorphan HBr
本藥可直接抑制延腦咳嗽中樞，達到鎮咳效果。可緩解由感冒、咽喉炎、支氣管炎及一般刺激所引起之咳嗽。其起始作用時間為15-30分鐘。

◎Carbinoxamine Maleate
為一抗組織胺劑。可有效緩解季節性鼻炎、常年性過敏鼻炎、也能有效解除感冒、過敏或次要的喉嚨刺激引起的咳嗽。

◎DL-Methylephedrine HCl
具擴張支氣管功能與中樞性鎮咳作用，能鬆弛氣管緊張並抑制咳嗽。

◎Potassium Guaiacolsulfonate
具祛痰作用，能緩解因痰液的刺激而引起的咳嗽。

【製造廠】衛達化學製藥股份有限公司　台中市工業區23路21號
【委託者】大裕生技興業有限公司　台中市西屯區府會園道179號19F
【諮詢電話】0800 043899

咳精膠囊 咳精膠囊 咳精膠囊
衛署藥製字第043297號G-6855
製造廠：衛達化學製藥股份有限公司
委託者：大裕生技興業有限公司
咳精膠囊 咳精膠囊 咳精膠囊