

感冒格嗽[®] 膠囊

CAMKSO[®] Capsules

【成分】：

有效成分及含量：每膠囊含(Each Capsule contains)：

Codeine Phosphate.....	6mg
Acetaminophen.....	300mg
Guaiacol Glyceryl Ether.....	83mg
Methylephedrine DL-HCl.....	10mg
Chlorpheniramine maleate.....	2mg

其他成分(賦形劑)：Dried Potato Starch、Talc、綠光透明帽-白色身0號膠囊(印字)(Gelatin、Purified Water、Glycerol、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide)。

【用途(適應症)】：感冒諸症狀(流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、咯痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：

- (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二)具有CYP2D6超級快速藥物代謝酵素的人(ultra-rapid metabolizers)。
- (三)哺乳婦。
- (四)未滿12歲。
- (五)兒童扁桃腺及腺樣體切除術後止痛。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- (一)產婦。
- (二)肝、腎功能不全的人。
- (三)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
- (四)有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人，因前列腺肥大引起排尿困難的人。
- (五)有心臟病及65歲以上的人。
- (六)正在服用血清素作用劑藥品(serotonergic drugs)的人，包括服用抗抑鬱藥及偏頭痛藥。
- (七)12至18歲，並有下列情形的人
 - ◆呼吸功能不全(可能症狀：呼吸困難)。
 - ◆神經肌肉疾病(可能症狀：肌肉無力)。
 - ◆嚴重心臟或呼吸系統疾病(可能症狀：胸痛、胸悶)。
 - ◆上呼吸道或肺部感染(可能症狀：流鼻涕、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛)。
 - ◆多重創傷或近期曾進行大範圍外科手術。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑師：

- (一)可能懷孕婦女。
- (二)正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
- (三)同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
- (四)服用鎮靜藥或安眠藥的人。

四、其他使用上注意事項：

- (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二)避免陽光直射。
- (三)勿超過建議使用量。
- (四)不要服用本藥超過七日。
- (五)服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
- (六)酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen(Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
- (七)可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
- (八)不得與酒精性飲料併用。

【用法用量】：

年齡	劑量
成人及15歲以上	1天3次，1次1粒，飯後服用。

【警語】：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用時，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑師：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有任何不適情形產生。
- (二)咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- (三)症狀沒有改善，或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (四)喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、頭暈、噁心或嘔吐。
- (五)服用過量[每日超過Acetaminophen4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (六)有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。
- (七)服藥後出現下列症狀：意識混亂、異常嗜睡、癱軟、呼吸緩慢或微弱、瞳孔變小、噁心、嘔吐、便秘、食慾不振、厭食及低血壓、性欲低下、陽痿或無月經等。
- (八)正在服用血清素作用劑藥品(serotonergic drugs)，包括服用抗抑鬱藥及偏頭痛藥，可能出現躁動、幻覺、昏迷、心悸過速、體溫過高、協調困難或僵直等症狀。

三、如需使用本品，應避免用藥期間以母乳哺育嬰兒。

四、長期使用本藥品易導致成癮。

【包裝】：6~1000粒塑膠瓶裝，鋁箔盒裝。

【類別】：醫師藥劑師指示藥品。

【儲存】：本藥請置於25°C以下，並避光存放。



PIC/S G.M.P. T E L：(04)26814585-7(三線)

PIC/S G.M.P. & 國際ISO 9001認證&中日合作廠

井田國際醫藥廠股份有限公司

CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.

台灣台中市大甲幼獅工業區幼獅路32號

諮詢專線：(0800)461461