統興奮的現象，而有失眠、緊張的情形，對於有痙攣性疾病的兒童使用須謹慎。

Potassium Guaiacolsulfate

被應用於祛痰劑的使用，直接促進呼吸道分泌物的流動，藉纖毛運動及咳嗽幫助將鬆開的物質送到咽部，而達到祛痰的效果。

【適應症】

鎮咳、祛痰（感冒、咽喉炎、急慢性支氣管炎、支氣管擴張、支氣管氣喘引起的咳嗽及咳痰困難）

【用法用量】

15歲以上，每次一膠囊，每日三次，飯後服用，兒童依年齡酌予減量，本藥須由醫師處方使用。

【副作用】

嗜睡、頭昏、噁心、倦怠。

【注意事項】

1. 置於小孩子無法接觸的地方。
2. 孕婦給藥應特別小心，不可超出使用範圍。
3. 使用抗組織胺藥劑，須醫師特別指示才可使用的患者：狹角性青光眼、氣喘、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難及因攝護腺肥大而排尿困難者。
4. 本藥有嗜睡作用，對於從事警覺性高的工作病患，應予以警告。
5. 15歲以下小孩，使用前請洽醫師。
6. 若有高燒、過敏、持續頭痛的現象，請洽醫師。
7. 不可超過使用量，若有嚴重副作用現象產生，應立即停藥就醫。

【包裝】

6~1000粒鋁箔盒裝

密封、避光、避熱、避濕儲存。



愛士頓醫藥股份有限公司

台南縣永康市仁愛街117號