外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	"派頓"排力敏錠5公絲	申請廠商	臺灣派頓化學製藥股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製 字第 043432 號		

Brikemin Tablets 5mg
" Patron " (mequitazine)
1000'S

TAIWAN PATRON CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

"派頓" **排力敏錠** 5公絲
（成　分）：每一錠中含有：
Mequitazine 5mg
（適應症）：過敏性鼻炎、蕁麻疹、濕疹、藥物過敏、乾草熱、血管神經性水腫、季節性結膜炎。
（用法用量）：一次5mg，早晚各服用一次。本藥須由醫師處方使用。
注意事項：請詳閱說明書使用。
衛署藥製字第 0 4 3 4 3 2 號
製造批號：
有效期限：
臺灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄縣岡山鎮為隨東路50號　TEL：(07)6216126-8

GMP藥品
衛署藥製字第043432號

89. 1. 17

"派頓" **排力敏錠** 5公絲

Brikemin Tablets 5mg "Patron"(mequitazine)

◇成分：每一錠中含有
Mequitazine……5mg
◇作用：
Mequitazine乃對組織胺(Histamine)中H1-receptor具有拮抗作用之phenothiazine衍生物，其藥理作用如下：
1. 具Chemical Mediator拮抗作用－具抗組織胺作用。
2. 可抑制Chemical Mediator之游離。
3. 具抗過敏原(Allergy)作用，對局部及全身性過敏性反應(Analphylaxis)皆有作用。
4. 具Antimucarinic作用及只有輕微中樞鎮靜作用。
◇本劑特點：
作用持久，一天服用2次，早晚各一次即可。
◇適應症：
過敏性鼻炎、蕁麻疹、濕疹、藥物過敏、乾草熱、血管神經性水腫、季節性結膜炎。
◇用法用量：一次5mg、早晚各服用一次。本藥須由醫師處方使用。
◇注意事項：
1. 一般注意：因有催眠作用，投與中之患者在駕駛車輛或操作危險性之機械操作者應特別注意。
2. 禁忌：
a)對於phenothiazine系化合物及其他類似化合物過敏者，應禁止使用本劑。
b)綠內障之患者。
c)前列腺肥大等下部尿路閉塞性疾患之患者。
3. 慎重投與：腎障害患者。
4. 相互作用：Barbituric acid誘導體、麻醉劑、麻醉性鎮痛劑、鎮靜劑及精神安定劑等中樞神經抑制劑、抗鬱劑、MAO(單胺氧化酶)阻害劑、若與類Atropine作用藥物併用或攝取酒精時，會增強其相互作用，應減量並慎重投與。
5. 副作用：
a)過敏症：偶有發疹，光線過敏症等症狀出現，應停止用藥。
b)肝臟：很少數有出現GOT、GPT上升之現象。
c)血液：很少數有出現血小板減少現象，認定異常時，應中止用藥。
d)精神神經系：偶有嗜睡、倦怠感、頭暈，很少數有頭痛、暈眩等症狀出現。
e)消化器：偶有口渴、胃部不適，很少數有下痢、便祕、食慾不振、嘔吐、胃痛、腹痛等症狀。
f)循環器：很少數有胸部苦悶感及心悸亢進的症狀。
g)泌尿器：很少數有排尿困難之症狀。
h)其他：很少數有咽喉痛、浮腫、臉部潮紅、視調節障礙等症狀。
6. 高齡者投與：臨床試驗中，高齡者的副作用以口渴發生率較高的傾向。
7. 孕婦之投與：關於孕婦投與之安全性尚未確立，故孕婦及有妊娠可能之婦人勿使用。
8. 小兒：對於小兒投與之安全性尚未確立(較少使用經驗)。
9. 遮光室溫保存。

包裝：4～1000粒　塑膠瓶裝、盒裝。

臺灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄縣岡山鎮為隨東路50號
TEL：(07)6216126～8

※外文仿單應檢附中文譯本

Brikemin Tablets 5mg "Patron" (Mequitazine)

Brikemin Tablets 5mg "Patron"
(mequitazine)

TAIWAN PATRON CHEMICAL &
PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

成分：每一錠中含有
Mequitazine……5mg
衛署藥製字第 043432 號
製造批號：
有效期限：

GMP 藥品

"派頓" 排力敏 錠 5 公絲

臺灣派頓化學製藥股份有限公司
高雄縣岡山鎮爲隨東路 50 號
TEL：(07)6216126～8

"派頓" 排力敏錠 5 公絲

適 應 症：過敏性鼻炎、蕁麻疹、濕疹、藥物過敏、乾草熱、血管神經性水腫、季節性結膜炎。

用法用量：一次 5mg、早晚各服用一次。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：請詳閱說明書後使用。

